

# Douvistome® ДОВИСТОМ®

## Oxiclozanid/Oxyclozanide

34 mg/ml

SUSPENSIE ORALĂ PENTRU BOVINE ȘI  
OVINE/ПЕРОРАЛНА СУСПЕНЗИЯ

1 Litru/литър

### COMPOZIȚIE

1 ml de suspensie orală conține 34 mg oxiclozanid.

### INDICAȚII

La bovine și ovine

- Tratatamentul și controlul

- Fasciozei (Fasciola hepatica, Fasciola gigantica)
- Parafasciozei (Paraphascium spp.)

- Eliminarea segmentelor cestodelor.

### MOD ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Bovine: 10 mg oxiclozanid / kg greutate vie, ceea ce corespunde cu 3 ml Douvistome / 10 kg greutate vie, administrat pe cale orală.

Nu trebuie depășită doza maximă de 3.5 g oxiclozanid per animal, adică 100 ml Douvistome / animal.  
Ovine: 5 mg oxiclozanid / kg greutate vie, ceea ce corespunde cu 4.5 ml Douvistome / 10 kg greutate vie, administrat pe cale orală.

Nu trebuie depășită doza maximă de 0.68 g oxiclozanid per animal, adică 20 ml Douvistome / animal.  
Pentru asigurarea administrării unei doze corecte, se recomandă estimarea corectă a greutății corporale pentru evitarea supra sau a subdozării, de asemenea trebuie verificată acuratețea dispozitivului de măsurat.

### TIMP DE AȘTEPTARE

Carnе și organe: 14 zile - Lapte: 0 zile

### ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauții speciale pentru utilizarea la animale: înainte de calcularea dozei, trebuie evaluată cât mai corect greutatea animalelor.

Agitați bine flaconul înainte de utilizare.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale: Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oxiclozanid trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.