

<p>Mod de administrare: vițelor subcutan, porcilor – i/muscular în doză de 0,5ml/10kg masă vie, 1 dată/zi, 3-5 zile; scroafelor în sindromul metrită-mastită-agalaxie – pe parcursul a 1-2 zile. În legătură cu senzația de durere care se poate manifesta, se recomandă administrarea într-un singur punct la purcei nu mai mult de 2,5 ml, la viței și porci numai mult de 5 ml.</p> <p>Contraindicații: Nu se recomandă administrarea preparatului vacilor mulgătoare, vițelor și purceilor nou-născuți, animalelor cu patologii renale și hepatice, cu dereglări a sistemului nervos și convulsii. Nu se permite combinarea lui cu levomicetina, antibioticele din grupul macrolizilor și tetraciclinelor, cu teofilina și preparatele antiinflamatoare nesteroide. Sacrificarea animalelor pentru consum uman se permite peste 21 zile de la ultima administrare a preparatului Coliflox.</p>	<p style="text-align: center;">COLIFLOX soluție injectabilă 1ml conține: enrofloxacină-50mg, sulfat de colistină- 500 000 UI pentru injecții steril uz veterinar</p> <p style="text-align: center;">100ml</p> <p style="text-align: center;">logotip AVZ</p>	<p>Indicații: se indică vițelor și purceilor pentru tratamentul colibacteriozei, salmonelozelor, pasteurelozei, bolilor respiratorii și a altor sisteme, agenții patogeni ale cărora sunt sensibili la enrofloxacină și colistină, porcilor – pentru tratamentul rinitei atrofice, pneumoniei enzootice și sindromului MMA.</p> <p>Condiții de păstrare: A se păstra în ambalaj original închis, aparte de produse alimentare și furaje, ferit de raze solare directe, inaccesibil pentru copii, la T⁰+5+25⁰C.</p> <p style="text-align: right;">TU9347-005-82436247-2008</p> <p>Seria <i>Valabil pînă la</i></p> <p style="text-align: right;">OOO NVТ „Аgrovetзащита” Rusia 141300, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tsentralnaja 1</p>
--	--	--