

NOVOCAINĂ 2% sol. inj.	MED-DO 049/2015
Ediția	2
Revizia	01
Pagina	59/78



NOVOCAINĂ 2%

soluție injectabilă
uz veterinar

Compoziție. Clorhidrat de procaină – 2,0 g
Apă distilată pînă la – 100 ml

Acțiune farmacoterapeutică. Anestezic local și depresor central moderat al zonelor motorii din scoarță, al centrilor vasomotor, respirator și termoregulator, acționînd totodată și ca analgesic, antispasmodic și ganglioplegic.

Indicații. În combaterea durerii prin infiltrații locale în anestezia tronculară și în anestezia epidurală. Pentru acțiune generală se recomandă în combaterea crampelor intestinale a crizelor vasculare, a șocului traumatic și anafilactic, a urticariei, a stărilor pruriginoase, a aritmiei cardiace.

Mod de administrare și doze. Pentru anestezia locală prin infiltrație se injectează soluție novocaină 2,0%, la animalele mari strat cu strat anatomic. Anestezia pe traiectul nervilor se realizează injectînd soluție cît mai aproape de nervul care inervează zona.

În anestezia epidurală se folosesc 5 – 10 ml soluție pentru intervențiile făcute pe animalele în picioare sau 10 – 20 ml soluție pentru animalele care trebuie să stea culcate.

Întrucît pisicile sînt foarte sensibile, acestora li se poate injecta soluția, dar cu multă prudență.

Contraindicații și precauții. Soluția novocaină 2,0% - nu se recomandă la animalele cu nefrite grave, insuficiență hepatică, hipertensiune și nu se asociază cu sulfanilamidele.

Timp de așteptare. La animalele de carne și cu lapte – o zi de la ultima administrare.

Condiții de păstrare. La temperatura 15 - 25°C, ferit de lumina.

Termen de valabilitate. 2 ani de la data fabricării.

Mod de prezentare. Flacoane cu 100 ml preparat.

Producător: S.R.L. „Medicamentum”, rn. Anenii Noi, s. Merenii Noi,
tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.

NOVOCAINĂ 0,5% sol. inj.	MED-DO 048/2015
Ediția	2
Revizia	01
Pagina	60/79



NOVOCAINĂ 0,5%

soluție injectabilă
uz veterinar

Compoziție. Clorhidrat de procaină – 0,5 g
Apă distilată pînă la – 100 ml

Acțiune farmacoterapeutică. Anestezic local și depresor central moderat al zonelor motorii din scoarță, al centrilor vasomotor, respirator și termoregulator, acționînd totodată și ca analgesic, antispasmodic și ganglioplegic.

Indicații. În combaterea durerii prin infiltrații locale în anestezia tronculară și în anestezia epidurală. Pentru acțiune generală se recomandă în combaterea crampelor intestinale a crizelor vasculare, a șocului traumatic și anafilactic, a urticariei, a stărilor pruriginoase, a aritmiei cardiace.

Mod de administrare și doze. Pentru anestezia locală prin infiltrație se injectează soluție novocaină 0,5% la animalele mari strat cu strat anatomic. Anestezia pe traiectul nervilor se realizează injectînd soluție cît mai aproape de nervul care inervează zona.

În anestezia epidurală se folosesc 5 – 10 ml soluție pentru intervențiile făcute pe animalele în picioare sau 10 – 20 ml soluție pentru animalele care trebuie să stea culcate.

Pe cale generală în special în tratamentul colicilor sau verucilor la animalele mari, intravenos lent 100 – 300 ml soluție 0,5%.

Întrucît pisicile sînt foarte sensibile, acestora li se poate injecta soluția, dar cu multă prudență.

Contraindicații și precauții. Soluția novocaină 0,5% - nu se recomandă la animalele cu nefrite grave, insuficiență hepatică, hipertensiune și nu se asociază cu sulfanilamidele.

Timp de așteptare. La animalele de carne și cu lapte – o zi de la ultima administrare.

Condiții de păstrare. La temperatura 15 - 25°C, ferit de lumina.

Termen de valabilitate. 2 ani de la data fabricării.

Mod de prezentare. Flacoane cu 100 ml preparat.

Producător: S.R.L. „Medicamentum”, rn. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.