

## COXIRIL<sup>®</sup> 0,2 % PREMIX

Marcă înregistrată și deținută de HUVEPHARMA AD.

### Introducere

Coxiril este un coccidiostatic sintetic foarte puternic care poate fi folosit strategic în programele de "clean up" (curățire) în cazul efectivelor cu presiune infecțioasă ridicată la intervale regulate.

Coxiril înlătură rezistența diferitelor tipuri de coccidii la ionofori și ajută ca eficacitatea acestora să crească în diverse programe pentru prevenirea coccidiozei.

### Utilizare multiplă

Cele mai multe companii rotesc programele anticoccigiene în mod regulat în programele "shuttle" la intervale între 4 - 6 luni. Prin rotația diferitelor produse anticoccigiene se obțin îmbunătățiri în performanțele puilor de carne prin creșterea nivelului de control al coccidiozei. Tradițional, programele de rotație conțin diferite clase de coccidiostatice.

Ca programul de rotație al coccidiostaticelor să fie eficient, trebuie să se folosească clase de produse diferite din punct de vedere chimic.

### Avantajele rotației coccidiostaticelor:

- rotația periodică a produselor previne folosirea lor îndelungată și dezvoltarea rezistenței la anumite produse
- toate produsele disponibile pot și ar trebui să fie folosite pentru a maximiza performanțele și a minimaliza riscul apariției rezistenței.

### COXIRIL în trei tipuri de programe anticoccigiene

1. COXIRIL în furajul starter "shuttle program" (chimic/ionofor)  
Presiunea infecțioasă care se poate acumula la sfârșitul perioadei de starter și care periclitează creșterea și performanțele economice ale puilor în prima perioadă, poate fi foarte eficient îndepărtată cu ajutorul COXIRIL. Prin rotația COXIRIL cu alte produse coccidiostatice va rezulta performanțe ridicate ale puilor de carne.  
Durata de folosire: 6 luni
2. COXIRIL în program complet  
Este recomandată folosirea COXIRIL în program complet în cazul fermelor cu presiune infecțioasă ridicată, în special după folosirea predominantă a ionoforilor.  
Durata de folosire: maxim 2 serii
3. COXIRIL - fără perioadă de așteptare la puii de carne

### Dozare:

Specii	Diclazuril (ppm)	Coxiril 0,2% premix (g/tonă)	Perioada de așteptare (zile)
Pui de carne	0,8-1,2	400-600	0
Curci pentru îngrasare	0,8-1,2	400-600	0
Bibilici pentru îngrasare	0,8-1,2	400-600	0

### Formulă protejată sub vacum

- COXIRIL 0,2% premix este formulat sub vacum cu ajutorul unei tehnici speciale care asigură fixarea moleculei de diclazuril pe particula de suport și o distribuție omogenă a diclazurilului în premix.
- COXIRIL 0,2% premix protejat sub vacum permite un excelent amestec în premix, concentrate și în furajul final

### Siguranță în folosire:

Nu sunt cunoscute incompatibilități cu alte medicamente sau alte ingrediente furajere.

### Toleranță:

Coxiril nu va influența consumul de furaj sau apă, nu induce stres de căldură și nu crește umiditatea așternutului. Marjă mare de toleranță pentru animale și oameni.

### Stabilitate:

Termenul de valabilitate este de 3 ani păstrat în ambalajul original în condiții recomandate (sub 25°C ferit de umezeală și acțiunea razelor solare).

Producător :  
**HUVEPHARMA AD**  
[www. Huvepharma.com](http://www.Huvepharma.com)

Distribuitor Romania:  
**SC ALTIUS SRL**  
Tel. 021 310 88 82/Fax 021 310 88 86  
e-mail [office@altius.ro](mailto:office@altius.ro)

