



PIROGUARD

Pulbere pentru soluție injectabilă

DESCRIERE. Galben-deschis pulbere amorfă, inodoră .

COMPOZIȚIE

1 g de medicament conține ingrediente active:

diminazene aceturate - 438 mg;

fenazonă - 562 mg.

ACȚIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ ȘI INDICAȚII

Comparație de preparat care conține substanța activă aceturate diminazene și fenazonă are un efect antiprotozoare înalt ,antibacterian, antimicotic, analgezic și antipiretic. Mecanismul de acțiune al aceturate diminazene este de a schimba procesul glicolizei aerobe și sinteza ADN protozoric, ducând la moartea lor. Fenazona are proprietăți analgezice, antipiretice și reduce permeabilitatea vasculară. Medicamentul este eficient împotriva Babesia (B. bovis, B. bigemina, B. ovis, B. caballi, B. divergens, B. major, B. canis), trypanosomoză(Tr. Vivax, Tr. Equiperdum, Tr. Evansi, Tr. brucei, Tr. congolense) și teilerii (T. annulata, T. ovis), inclusiv împotriva tulpinilor rezistente la alte medicamente și invazii asociate cu protozoare

SPECII ȚINTĂ

Prevenirea și tratamentul bolii parazitare în sânge (babezioză ,piroplasmoză, trypanosomoză, theilerioză) la bovine, ovine, caprine, cai, porci, câini și pisici.

POSOLOGIE, CALE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul este utilizat sub forma unei soluții 7%. Pentru a prepara soluția în flaconul cu pulbere (ambalate 0,24 g, 2,4 g sau 24 g) se introduce apă sterilă pentru injecție într-o cantitate corespunzătoare - 1,25 ml; 12,5 ml sau 125 ml. Soluția astfel preparată de medicament se administrează intramuscular sau subcutanat în doze de:

bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine: doza terapeutică de 1 ml per 20 kg de greutate corporală (3,5 mg diminazene aceturate per 1 kg de greutate corporală).

În cazul în care, starea generală a animalului nu se îmbunătățește, după 24-30 ore, se va repeta cu soluția preparată în aceeași doză. La detectarea primelor animale infectate în turmă, ca măsură profilactică pentru toate animalele se va administra soluția cu medicament într-o doză de 1 ml per 40 kg greutate corporală.

Câini, pisici: preparatul este indicat să se utilizeze sub formă de soluție 3,5% (pentru conținutul acestui flacon se dizolvă volum dublu de apă) și se administrează la 0,1 ml per 2 kg de greutate corporală de două ori la un interval de 24 de ore.

CONTRAINDICAȚII, PRECAUȚII ȘI REACȚII ADVERSE

Inflamarea rinichilor; hipersensibilitate la medicament.

Sacrificarea animalelor pentru carne este permisă în 20 de zile, utilizarea lapte pentru consumul uman - 3 zile de la ultimul tratament. Înainte de expirarea termenului de carne în cazul sacrificării forțate folosite pentru hrana animalelor carnivore sau pentru producția de făină de carne și oase, laptele poate fi folosit pentru hrana animalelor.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne-20 zile

Lapte-3 zile

MOD DE PREZENTARE

Flacoane de sticlă sigilate cu dopuri de cauciuc și capace metalice, 0,24g, 2.4g și 24g.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

Uscat, întunecat, loc inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 8 ° C până la 20 ° C .

Perioada de valabilitate - 3 ani de la data fabricației.

Pentru utilizare în medicina veterinară!