

OXITOCINĂ 10UA/ 1 ml sol. inj.	MED-DO 015/2014
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	56/77



OXITOCINĂ 10 UA/1 ml
Soluție injectabilă
uz veterinar

Compoziție. 1 ml soluție conține 10 UA oxitocină sintetică.

Acțiune farmacoterapeutică. Oxitocina este hormonul hipofizar cu structură proteico - peptidică. Posedă acțiuni stimulatorie asupra musculaturii netede a uterului, are efect uterotonic, manifestat prin scurtarea frecvenței și contracțiilor miometrului și creșterea amplitudinii acestuia.

Indicații. În toate cazurile fătări laborioase și la animalele epuizate pentru a amplifica eforturile de expulzare, pentru sporirea involuției uterine și pentru desprinderea și eliminarea completă a involutorilor fetale în combinație cu antibiotice sau alte chimioterapice, în tratamentul hipotoniilor, atoniilor, hemoragiilor uterine, agalaxiei post partum la scroafe, eliberarea laptelui rezidual și tratamentul mamitelor.

Mod de administrare și doze. Subcutan sau intramuscular în doze (UA):

Nr	Specie animale	Doze (UA)
1.	Vaci	30-60
2.	Iepe	30-60
3.	Oi, capre	10-15
4.	Scroafe	20-30
5.	Cățele	5-10
6.	Pisici	2-3

Produsul se va injecta lent, mai întâi în doze minime. După 20 – 30 min., dacă este cazul, se pot administra doze mai mari.

Contraindicații. Nu se va administra în parturiții cu complucații (fetusii prea mari, poziții anormale ale fetusilor, torsiune uterină) sau cu obstacole ale căii de expulzare. Nu se va administra la femele gestante până în momentul parturii.

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă. Administrarea produsului la animalele parturiente se face după o verificare atentă a colului uterin care trebuie să fie suficient de dilatat, iar fătul să aibă o poziție eutocică.

Reacții adverse. Dozele mari de oxitocină pot determina contracții spastice sau chiar să oprească evoluția parturii, desprinderea prematură a placentei, bradicardie, aritmii și chiar moartea fătului.

Timp de așteptare. Carne și organe : 0 zile.

Condiții de păstrare. La loc uscat, ferit de lumină la temperatura +3 +12°C.

Transportarea (până la 3 zile) se permite la temperatura +25°C. Este strict interzis înghețarea produsului.

Mod de prezentare. Flacon 10 ml, 100 ml, însoțit de prospectul de utilizare.

Termen de valabilitate. 2 ani

Producător. SA „Medicamentum”, m. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.