



DICOXOL-5 WS



**Diclazuril 0,5% pulbere hidrosolubilă
(pentru uz veterinar)**

COMPOZIȚIE:
Diclazuril - 5mg
Excipienți până la 1g

ACȚIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ:
Diclazurilul este eficient în prevenirea și tratamentul infestării cu Eimeria tenella, Eimeria acer vulina, Eimeria necatrix, Eimeria bruneti, Eimeria maxima. Are acțiune coccidică, care ne permite să monitorizăm coccidiozele la nivel de cecumuri. Este eficient la toate etapele de dezvoltare a Eimeriilor. Nu sunt cunoscute efecte adverse asupra organismului animal. Favorizează creșterea conversiei furajelor și reduce mortalitatea.

INDICAȚII:
Prevenirea și tratarea coccidiozelor la porci, miei, iepuri și păsări.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE:
Se administrează oral cu apa sau furajele: păsări, iepuri, porci, miei - 1g/1-2 L apă sau 1 g/1-2 kg furaj, timp de 2-5 zile. Cu scop preventiv se propun cure a câte 7-10 zile în doze de 1g/5L apă sau 1g/5 kg furaj.

TIMP DE AȘTEPTARE:
Se permite sacrificarea animalelor și păsărilor la 7 zile după administrarea preparatului.

Data preparării:
Expiră:
Seria:

1000 g










Producător: Shandong Socom Animal Remedy Co., Ltd.
Distribuitor: NUTRIFARM SRL, nr. Ciuginku, str. P. Rares 77
tel.: +373 79 518 904; +373 79 518 905; nutritfarm@yahoo.com



DICOXOL-5 WS



**Diclazuril 0,5% pulbere hidrosolubilă
(pentru uz veterinar)**

COMPOZIȚIE:
Diclazuril - 5mg
Excipienți până la 1g

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE:
Se administrează oral cu apa sau furajele: păsări, iepuri, porci, miei - 1g/1-2 L apă sau 1 g/1-2 kg furaj, timp de 2-5 zile. Cu scop preventiv se propun cure a câte 7-10 zile în doze de 1g/5L apă sau 1g/5 kg furaj.

TIMP DE AȘTEPTARE:
Se permite sacrificarea animalelor și păsărilor la 7 zile după administrarea preparatului.

Data preparării:
Expiră:
Seria:

100 g

08.2012
08.2014
0140812












DICOXOL-5 WS



**Diclazuril 0,5% pulbere hidrosolubilă
(pentru uz veterinar)**

COMPOZIȚIE:
Diclazuril - 5mg
Excipienți până la 1g

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE:
Se administrează oral cu apa sau furajele: păsări, iepuri, porci, miei - 1g/1-2 L apă sau 1 g/1-2 kg furaj, timp de 2-5 zile. Cu scop preventiv se propun cure a câte 7-10 zile în doze de 1g/5L apă sau 1g/5 kg furaj.

TIMP DE AȘTEPTARE:
Se permite sacrificarea animalelor și păsărilor la 7 zile după administrarea preparatului.

Data preparării:
Expiră:
Seria:

100 g

08.2012
08.2014
0140812








