

(model etichetă)

Mod de administrare și dozaj: puilor de carne, tineretului aviar, curcilor, găștilor și rațelor se administrează în apa de băut
- 1 ml/ 1 l apă de băut care se administrează timp de 48 ore.
3 ml/1 l apă de băut, care se administrează timp de 8 ore.

În cazuri grave tratamentul se repetă peste 5 zile.

Pe toată durata tratamentului pasărea trebuie să consume numai apă cu preparatul dat. Soluția curativă își păstrează calitățile timp de 48 ore. În cazul apariției sedimentului, soluția se agită bine pînă la omogenizare.

Contraindicații: Nu se administrează găinilor ouătoare din motivul acumulării în ouă. Se interzice administrarea după expirarea termenului de valabilitate. Eimitem 2.5% este compatibil cu vitaminele, adaosurile furajere și toate preparatele folosite în avicultură.

Timp de așteptare: Sacrificarea puilor de carne pentru consum uman se permite peste 14 zile, a curcilor, găștelor și rațelor nu mai devreme de 16 zile de la ultima administrare.

EIMITERM 2,5 %

anticoccidian

SOLUȚIE 2,5%

orală

1ml conține toltrazuril 25mg

Pentru uz veterinar

100 ml

LOGOU

Indicații: în tratamentul și profilaxia coccidiozei puilor de carne, tineretului aviar, a curcilor, găștilor și rațelor cu scop preventiv și curativ la apariția primelor simptome a bolii.

Condiții de păstrare: A se păstra în ambalaj original închis, la loc ferit de lumină și umiditate, aparte de produse alimentare și furaje la T+5+25C. La loc inaccesibil penru copii.

seria

Valabil pînă la

STO76069684-0106-2011

SRL "NVT Agrovetzașcita"

