

COMPOZIȚIE:
Enrofloxacină - 100mg
Excipienți până la 1ml

AȚIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ:
Enrofloxacină este utilizată în profilaxia și tratamentul infecțiilor la animale. Enrofloxacină face parte din clasa fluorquinolonelor. Acțiunea enrofloxacină constă în inhibarea sintezei de ADN la nivel de celulă bacteriană. Acționează asupra E. Coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Salmonella ș. a.

- INDICAȚII:**
1. Diareea cauzată de E. Coli la purceli nou-născuți (până la 7 zile) și din perioada înțărării.
 2. Enterita hemoragică, febra tifoidă și paratifoidea, infecții secundare care apar pe fondul enteritelor.
 3. Dizenteria și pastereleza melor nou-născuți.
 4. Streptococoză, hidropesia porcine, cauzată de E. Coli
 5. Pneumonia enzootică și renita atrofică porcine.
 6. Diareea albă, colibaciloza, holera și infecțiile respiratorii cronice la păsări.

BPV

ENRO-100
ENROFLOXACIN 10% INJECTABILĂ



PENTRU UZ
VETERINAR 100ml
NUTRITFARM SRL

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE:

Se administrează intramuscular, în doză unică de 0,2ml/kg greutate vie la viței, miei, lei, cini și iepuri cu scop curativ. În caz de tratament se recomandă de repetat procedura încă 1-2 zile. Animalele care prezintă o deshidratare pronunțată se recomandă să fie rehidratate. Animalelor adulte li se recomandă doza intramusculară de 2,5-5ml/100kg greutate vie timp de 3-5 zile. Pentru cini adulți se recomandă 0,5ml/10kg greutate vie timp de 3-5 zile.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne, de bovine - 14 zile, de porc - 10 zile.

Data preparării: 08.2012
Expiră: 08.2014
Seria: 0340812



Producător: Shandong Socom Animal Remedy Co., Ltd.
Distribuitor: NUTRITFARM SRL, or. Chigînkî, str. P. Rareș 77
tel.: +373 79 518 904; +373 79 518 905; nutritfarm@yahoo.com

COMPOZIȚIE:
Enrofloxacină - 100mg
Excipienți până la 1ml

AȚIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ:
Enrofloxacină este utilizată în profilaxia și tratamentul infecțiilor la animale. Enrofloxacină face parte din clasa fluorquinolonelor. Acțiunea enrofloxacină constă în inhibarea sintezei de ADN la nivel de celulă bacteriană. Acționează asupra E. Coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Salmonella ș. a.

- INDICAȚII:**
1. Diareea cauzată de E. Coli la purceli nou-născuți (până la 7 zile) și din perioada înțărării.
 2. Enterita hemoragică, febra tifoidă și paratifoidea, infecții secundare care apar pe fondul enteritelor.
 3. Dizenteria și pastereleza melor nou-născuți.
 4. Streptococoză, hidropesia porcine, cauzată de E. Coli
 5. Pneumonia enzootică și renita atrofică porcine.
 6. Diareea albă, colibaciloza, holera și infecțiile respiratorii cronice la păsări.

BPV

ENRO-100
ENROFLOXACIN 10% INJECTABILĂ



PENTRU UZ
VETERINAR 100ml
NUTRITFARM SRL

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE:

Se administrează intramuscular, în doză unică de 0,2ml/kg greutate vie la viței, miei, lei, cini și iepuri cu scop curativ. În caz de tratament se recomandă de repetat procedura încă 1-2 zile. Animalele care prezintă o deshidratare pronunțată se recomandă să fie rehidratate. Animalelor adulte li se recomandă doza intramusculară de 2,5-5ml/100kg greutate vie timp de 3-5 zile. Pentru cini adulți se recomandă 0,5ml/10kg greutate vie timp de 3-5 zile.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne, de bovine - 14 zile, de porc - 10 zile.

Data preparării: 08.2012
Expiră: 08.2014
Seria: 0340812



Producător: Shandong Socom Animal Remedy Co., Ltd.
Distribuitor: NUTRITFARM SRL, or. Chigînkî, str. P. Rareș 77
tel.: +373 79 518 904; +373 79 518 905; nutritfarm@yahoo.com

COMPOZIȚIE:
Enrofloxacină - 100mg
Excipienți până la 1ml

AȚIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ:
Enrofloxacină este utilizată în profilaxia și tratamentul infecțiilor la animale. Enrofloxacină face parte din clasa fluorquinolonelor. Acțiunea enrofloxacină constă în inhibarea sintezei de ADN la nivel de celulă bacteriană. Acționează asupra E. Coli, Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella, Salmonella ș. a.

- INDICAȚII:**
1. Diareea cauzată de E. Coli la purceli nou-născuți (până la 7 zile) și din perioada înțărării.
 2. Enterita hemoragică, febra tifoidă și paratifoidea, infecții secundare care apar pe fondul enteritelor.
 3. Dizenteria și pastereleza melor nou-născuți.
 4. Streptococoză, hidropesia porcine, cauzată de E. Coli
 5. Pneumonia enzootică și renita atrofică porcine.
 6. Diareea albă, colibaciloza, holera și infecțiile respiratorii cronice la păsări.

BPV

ENRO-100
ENROFLOXACIN 10% INJECTABILĂ



PENTRU UZ
VETERINAR 100ml
NUTRITFARM SRL

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE:

Se administrează intramuscular, în doză unică de 0,2ml/kg greutate vie la viței, miei, lei, cini și iepuri cu scop curativ. În caz de tratament se recomandă de repetat procedura încă 1-2 zile. Animalele care prezintă o deshidratare pronunțată se recomandă să fie rehidratate. Animalelor adulte li se recomandă doza intramusculară de 2,5-5ml/100kg greutate vie timp de 3-5 zile. Pentru cini adulți se recomandă 0,5ml/10kg greutate vie timp de 3-5 zile.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Carne, de bovine - 14 zile, de porc - 10 zile.

Data preparării: 08.2012
Expiră: 08.2014
Seria: 0340812



Producător: Shandong Socom Animal Remedy Co., Ltd.
Distribuitor: NUTRITFARM SRL, or. Chigînkî, str. P. Rareș 77
tel.: +373 79 518 904; +373 79 518 905; nutritfarm@yahoo.com