



OXYVET RETARD



COMPOZIȚIE:

Oxytetracycline -200mg
Pirolidonă și apă purificată
până la 1ml.

INDICAȚII:

În tratamentul și prevenirea mai
multor infecții cu bacterii Gram-pozitive
și Gram-negative, așa ca Bordetella,
Campylobacter, Chlamydia, E. coli,
Haemophilus, Mycoplasma, Pasteurella,
Rickettsia, Salmonella, Staphylococcus
and Streptococcus spp.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZE:

Se administrează intramuscular sau subcutanat:
General: 1 ml per 10 kg greutate corporală.
Această doză poate fi repetată peste 48 de
ore dacă este necesar.
NU se va administra mai mult de 20ml
la bovine și 10ml la suine, și mai mult de 5ml
la vitei, capre și oi, într-un singur loc de elecție.

100 ml



OXYVET RETARD



CONTRAINDICAȚII:

Nu se va administra animalelor cu
sensibilitate la grupul tetraciclinelor.
Nu se recomandă administrarea la
animalele cu insuficiență renală și
hepatică pronunțată. De asemenea
nu se administrează concomitent cu
penicilinele, cefalosporinele, quinolonele
și cicloserinele.

Distribuitor:

NUTRITFARM SRL, or. Chișinău,
str. P. Rareș 77
tel/fax.: (+373) 22 89 04 04;
nutrifarm@yahoo.com

Producător:

Shandong Socom Animal Remedy Co., Ltd.



100 ml

Data preparării:
Expiră:
Seri