

ALBENDAZOL comprimate	MED-DO 043/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	19/90

# ALBENDAZOL 10

-comprimate antiparazitare-

-uz veterinar-

**Compoziție.** Fiecare comprimat conține:

Albendazol.....10mg

Excipient până la.....100mg

## Acțiune farmacoterapeutică.

**Farmacodinamica.** Albendazol-ul este antihelmintic cu spectru larg de acțiune din grupa benzimidazolice, activ față de nematode gastrointestinale și pulmonare (forme adulte, larve, ouă), trematode adulte și cestode.

Albendazolul produce moartea paraziților prin blocarea sistemelor enzimatic implicate în captarea glucozei.

**Farmacocinetica.** Administrat pe cale orală, se absoarbe rapid și difuzează în toate organele și țesuturile.

Produsul este rapid biotransformat în sulfonat și sulfoxid de albendazol, metaboliți activi față de trematode și cestode. Se elimină predominant prin urină.

**Toxicitatea** preparatului este redusă în dozele terapeutice (limita – intervalul de siguranță este de 7,5 – 20 de ori decît dozele recomandate) și nu posedă acțiune, iritant-locală și sensibilizantă.

## Indicații.

Indicat în dehelmentizarea păsărilor, porcinelor, cînilor, pisicilor.

**Păsări:** Ascaridia gallinarum, Heterakis gallinae, Capillaria spp., Syngamus trachea.

**Cîini:** Toxocara canis, Ancylostoma spp., Uncinaria spp., Trichocephalus vulpis.

S.R.L. "Medicamentum"  
Republica Moldova

ALBENDAZOL comprimate	MED-DO 043/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	20/90

**Pisici:** Paragonimus spp.

**Porci:** Ascaris suum, Metastrongylus spp., trichocephalus spp., Trichinella spiralis, Oesophagostomum spp.

### Mod de administrare și doze.

❖ **Păsări:** 1comprimat/kg greutate corporală pe zi (10mg albendazol), timp de 2-3zile.

❖ **Carnasiere:**

1 compimat/kg greutate corporală pe zi (10mg albendazol) în cestodoze și nematodoze, 2-3 zile.

2,5 comprimate/kg greutate corporală pe zi (25mg albendazol), în Tricocefaloză, timp de 3 zile.

❖ **Porci:** 1 compimate/ kg greutate corporală pe zi (10mg albendazol) în ascaridoză, metasrongiloză, oesofagostomoză, tricocefaloză și trichineloză timp de 2 – 3 zile.

### Contraindicații.

Nu se va administra femelelor aflate în prima treime a perioadei de gestație.

### Reacții adverse.

În dozele terapeutice indicate nu sînt.

### Timp de așteptare.

Carne 10 zile după ultimul tratament.

**Atenționări speciale.** Nu este cazul.

**S.R.L. "Medicamentum"**  
**Republica Moldova**

<b>ALBENDAZOL comprimate</b>	<b>MED-DO 043/2015</b>
<b>Ediția</b>	<b>1</b>
<b>Revizia</b>	<b>00</b>
<b>Pagina</b>	<b>21/90</b>

**Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor, după caz.**

Pentru protecția mediului medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere, ci în locuri special amenajate. Orice produs medical veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**Condiții de păstrare.** La temperatura camerei, ferit de lumina.

**Termen de valabilitate.** 2 ani de la data fabricării.

**Mod de prezentare.** Borcănășe cu 100 comprimate „ALBENDAZOL 10”.

**Producător.** S.R.L. „Medicamentum”, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.

ALBENDAZOL comprimate	MED-DO 043/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	22/90

# ALBENDAZOL 30

-comprimate antiparazitare-

-uz veterinar-

**Compoziție.** Fiecare comprimat conține:

Albendazol.....30mg

Excipient pînă la.....100mg

## Acțiune farmacoterapeutică.

**Farmacodinamica.** Albendazol-ul este antihelmintic cu spectru larg de acțiune din grupa benzimidazolice, activ față de nematode gastrointestinale și pulmonare (forme adulte, larve, ouă), trematode adulte și cestode.

Albendazolul produce moartea paraziților prin blocarea sistemelor enzimatic implicate în captarea glucozei.

**Farmacocinetica.** Administrat pe cale orală, se absoarbe rapid și difuzează în toate organele și țesuturile.

Produsul este rapid biotransformat în sulfonat și sulfoxid de albendazol, metaboliți activi față de trematode și cestode. Se elimină predominant prin urină.

**Toxicitatea** preparatului este redusă în dozele terapeutice (limita – intervalul de siguranță este de 7,5 – 20 de ori decît dozele recomandate) și nu posedă acțiune, iritant-locală și sensibilizantă.

## Indicații.

Indicat în dehelmentizarea păsărilor, porcinelor, cîinilor, pisicilor.

**Păsări:** Ascaridia gallinarum, Heterakis gallinae, Capillaria spp., Syngamus trachea.

**Cîini:** Toxocara canis, Ancylostoma spp., Uncinaria spp., Trichocephalus vulpis.

S.R.L. "Medicamentum"  
Republica Moldova

ALBENDAZOL comprimate	MED-DO 043/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	23/90

**Pisici:** Paragonimus spp.

**Porci:** Ascaris suum, Metastrongylus spp., trichocephalus spp., Trichinella spiralis, Oesophagostomum spp.

### Mod de administrare și doze.

- ❖ **Păsări:** 1 comprimat/3 kg greutate corporală pe zi (30mg albendazol), timp de 2-3 zile.
- ❖ **Carnasiere:**
  - 1 comprimat/ 3 kg greutate corporală pe zi (30mg albendazol) în cestodoze și nematodoze, 2-3 zile.
  - 1 comprimate/kg greutate corporală pe zi (30 mg albendazol), în Tricocefaloză, timp de 3 zile.
- ❖ **Porci:** 1 comprimat/ 3 kg greutate corporală pe zi (30mg albendazol) în ascaridoză, metasrongiloză, oesofagostomoză, tricocefaloză și trichineloză timp de 2 – 3 zile.

### Contraindicații.

Nu se va administra femelelor aflate în prima treime a perioadei de gestație.

### Reacții adverse.

În dozele terapeutice indicate nu sînt.

### Timp de așteptare.

Carne 10 zile după ultimul tratament.

**Atenționări speciale.** Nu este cazul.

**S.R.L. „Medicamentum”**  
**Republica Moldova**

<b>ALBENDAZOL comprimate</b>	<b>MED-DO 043/2015</b>
<b>Ediția</b>	<b>1</b>
<b>Revizia</b>	<b>00</b>
<b>Pagina</b>	<b>24/90</b>

**Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor, după caz.**

Pentru protecția mediului medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere, ci în locuri special amenajate. Orice produs medical veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**Condiții de păstrare.** La temperatura camerei, ferit de lumina.

**Termen de valabilitate.** 2 ani de la data fabricării.

**Mod de prezentare.** Borcănașe cu 100 comprimate „ALBENDAZOL 30”.

**Producător.** S.R.L. „Medicamentum”, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.

S.R.L. "Medicamentum"  
Republica Moldova

ALBENDAZOL comprimate	MED-DO 043/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	25/90

# ALBENDAZOL 360

-comprimate antiparazitare-

-uz veterinar-

**Compoziție.** Fiecare comprimat conține:

Albendazol.....360 mg

Excipient pînă la.....1800 mg

## Acțiune farmacoterapeutică.

**Farmacodinamica.** Albendazol-ul este antihelmintic cu spectru larg de acțiune din grupa benzimidazolice, activ față de nematode gastrointestinale și pulmonare (forme adulte, larve, ouă), trematode adulte și cestode.

Albendazolul produce moartea paraziților prin blocarea sistemelor enzimaticice implicate în captarea glucozei.

**Farmacocinetica.** Administrat pe cale orală, se absoarbe rapid și difuzează în toate organele și țesuturile.

Produsul este rapid biotransformat în sulfonat și sulfoxid de albendazol, metaboliți activi față de trematode și cestode. Se elimină predominant prin urină.

**Toxicitatea** preparatului este redusă în dozele terapeutice (limita – intervalul de siguranță este de 7,5 – 20 de ori decît dozele recomandate) și nu posedă acțiune, iritant-locală și sensibilizantă.

## Indicații.

În dehilmentizarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, cabalinelor, animalelor mici și păsărilor în caz de: trematodoze (fascioloze, dicrocelioze, paramfitomatoze); cestodoze (moniezioze, avitelinoze, tizaniezioze); nematodoze pulmonare, gastro-intestinale.

ALBENDAZOL comprimate	MED-DO 043/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	26/90

### Mod de administrare și doze.

Se administrează pe cale orală individual sau în grup (în prealabil mărunțind comprimatele) în amestec cu hrana, (bovinelor, caprinelor, porcinelor și cabalinelor în doză unică, iar animalelor mici și păsărilor două zile consecutiv).

- ❖ *Bovinelor* – 1 comprimat/50 kg greutate corporală. În caz de trematodoze și ostertagioze – 1 comprimat/35 kg greutate corporală.
- ❖ *Ovinelor și caprinelor* – 1 comprimat/70 kg greutate corporală. În caz de trematodoze și protostrongiloidoze – 1 comprimat/45 kg greutate corporală.
- ❖ *Porcinelor* – 1 comprimat/35 kg greutate corporală.
- ❖ *Cabalinelor* – 1 comprimat/50 kg greutate corporală.
- ❖ *Animalelor mici* – 1 comprimat /25 kg greutate corporală.
- ❖ *Păsărilor* – 1 comprimat (în prealabil mărunțit)/36 kg greutate corporală pe zi /2 zile consecutiv.

### Contraindicații.

Albendazol-ul nu se va administra în caz de: fascioloze acute; ovinelor în prima perioadă de gestație; femelele altor specii – în prima treime a perioadei de gestație; animalelor bolnave de boli infecțioase și cahexie avansată.

### Reacții adverse.

În dozele terapeutice indicate nu sînt.

### Timp de așteptare.

Pentru carne: 10 zile (porcine, cabaline, păsări), 14 zile (bovine ovine, caprine).

Pentru lapte: 4 zile.

**Atenționări speciale.** Nu este cazul.

**S.R.L. "Medicamentum"**  
**Republica Moldova**

<b>ALBENDAZOL comprimate</b>	<b>MED-DO 043/2015</b>
<b>Ediția</b>	<b>1</b>
<b>Revizia</b>	<b>00</b>
<b>Pagina</b>	<b>27/90</b>

**Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor, după caz.**

Pentru protecția mediului medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere, ci în locuri special amenajate. Orice produs medical veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

**Condiții de păstrare.** La temperatura camerei, ferit de lumina.

**Termen de valabilitate.** 2 ani.

**Mod de prezentare.** Cutii cu 80 comprimate „ALBENDAZOL 360”.

**Producător.** S.R.L. „Medicamentum”, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.