

## **Biogenta**

### **Compoziție:**

Amoxicilină	150mg
Gentamicina	40 mg
Excipient soluție	1 ml

### **Acțiune:**

Amoxicilina este o penicilină semisintetică ,care are puternică acțiune bactericidă asupra Gram pozitive și Gram negative:

(Clostridium,Campylobacter,Corynebacterium,E.coli,Erysipelothrix,Haemophilus,Pasteurella,Salmonella, Staphylococcus și streptococcus).Amoxicilina se elimina cu urina iar o parte prin bila.

Actiunea bactericida este datorita blocarii metabolismului proteic al germenilor patogeni.Se manifesta asupra microorganismelor ca:streptococii,stafilecocii,pneumococii,colibacilii,Salmonella spp.Pasteurella spp,Klebsilla spp,Proteus spp, Mycoplasma spp, etc.

### **Indicații:**

Infecțiile gastrointestinale,respiratorice,urogenitale sensibile la amoxicilină ca: Clostridium,Campylobacter,Corynebacterium,E.coli,Erysipelothrix,Haemophilus,Pasteurella,Salmonella, Staphylococcus și Streptococcus.spp,la viței,capre,oi,porcine.

### **Contraindicații:**

Reacția alergică la amoxicilină si gentamicina.

Nu se vor trata animalele cu insuficiență renală gravă.

Nu se administrează concomitent cu alte preparate — tetraciline,chloramfenicol,macrolide,lincosamide.

### **Precauții:**

Reacția alergică.

### **Administrare și dozare:**

Intramuscular

Inainte de folosire se agita bine.

1 ml la 10 kg masa vie ,dupa necesitate se repeta după 48 ore.

Nu se injecteaza mai mult de 20 ml intrun singur loc la bovine și 10 ml la porcine,5 ml la vitei.

Vite 30-40 ml in decurs de 3 zile

Vitei 10-15 ml in decurs de 3 zile

Porcine 5-10 ml in decurs de 3 zile

Purcei 1-5 ml in decurs de 3 zile

### **Timp de așteptare:**

Pentru carne:- 30 zile.

Lapte:- 2 zile.

### **Mod de prezentare:**

Flacon 100 ml.

