

PICĂTURI INSECTOACARICIDE	MED-DO 045/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	16/72

„BOBI”

picături insectoacaricide pentru câini

- uz veterinar -

Compoziție.

Permetrină – 5,0 g

Excipient până la – 100 ml

Acțiune.

Permetrina posedă o acțiune insectoacaricidă pronunțată și sistematizată. Aplicat extern preparatul se acumulează în epidermă și glandele sebacee ale animalului. Efectul letal al ectoparaziților se produce în urma contactului acestora cu blana și pielea animalului prelucrat, asigurînd protecția animalelor pe o perioadă de 1 – 2 luni. Preparatul este ușor tolerat de către câini.

Indicații.

Preparatul „BOBI” picături insectoacaricide este indicat pentru combaterea păduchilor, puricilor, căpușelor.

Mod de aplicare și doze.

Preparatul „BOBI” se aplică cîteva picături pe spate între omoplați și în regiunea gîtului la baza capului (locuri inaccesibile pentru a fi linse de către animal).

Câini:

- ❖ 2 – 10 kg 1 ml;
- ❖ 11 – 20 kg 2 ml;
- ❖ 21 – 30 kg 3 ml;
- ❖ Mai mult de 31 kg 4 ml.

PICĂTURI INSECTOACARICIDE	MED-DO 045/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	17/72

Aplicarea repetată a preparatului se efectuează, 1 dată în lună în caz de infestări cu păduchi și purici, și 1 dată în 2 săptămâni în caz de infestări cu căpușe. Pentru prevenirea reinfestărilor cu purici și păduchi este important să fie prelucrat și așternutul animalului, prin pulverizare cu produs insectoacaricid.

Contraindicații și precauții.

Contraindicat animalelor lactante, celor aflate în perioada de reconvașcență, cât și tineretului mai mic de 10 săptămâni. În caz de sensibilitate individuală (intoxicații), care este manifestată prin lacrimație, salivație abundentă, vomă și frisoane, animalul va fi spălat cu apă caldă și se vor administra preparate antihistaminice.

Nu este recomandat scăldatul animalului cu 3 zile pînă, și 3 zile după prelucrare. Păstrați recipientele bine închise. A se evita contactul cu ochii. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. În timpul manipulării produsului se interzice de a fuma, a bea apă, a mânca. După utilizarea preparatului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

Condiții de pastrare. A se păstra numai în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemîna copiilor. Separat de produsele alimentare și hrana animalelor. La temperatura 0 - 30°C, loc uscat, ferit de lumină.

Mod de prezentare. Flacon-picurător 5 ml, însoțit de prospectul de utilizare.

Producător. S.R.L. „Medicamentum”, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.

PICĂTURI INSECTOACARICIDE	MED-DO 045/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	18/72

„PUFFI”

picături insectoacaricide pentru câini

- uz veterinar -

Compoziție.

Permetrină – 5,0 g

Excipient pînă la – 100 ml

Acțiune.

Permetrina posedă o acțiune insectoacaricidă pronunțată și sistematizată. Aplicat extern preparatul se acumulează în epidermă și glandele sebacee ale animalului. Efectul letal al ectoparaziților se produce în urma contactului acestora cu blana și pielea animalului prelucrat, asigurînd protecția animalelor pe o perioadă de 1 – 2 luni. Preparatul este ușor tolerat de către pisici.

Indicații.

Preparatul „PUFFI” picături insectoacaricide este indicat pentru combaterea păduchilor, puricilor, căpușelor.

Mod de aplicare și doze.

Preparatul „PUFFI” se aplică cîteva picături pe spate între omoplați și în regiunea gîtului la baza capului (locuri inaccesibile pentru a fi linse de către animal).

Pisici:

- ❖ pînă la 1 kg 10 picături;
- ❖ 2 – 3 kg 20 picături;
- ❖ 4 – 8 kg 1 ml.

PICĂTURI INSECTOACARICIDE	MED-DO 045/2015
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	19/72

Aplicarea repetată a preparatului se efectuează, 1 dată în lună în caz de infestări cu păduchi și purici, și 1 dată în 2 săptămâni în caz de infestări cu căpușe. Pentru prevenirea reinfestărilor cu purici și păduchi este important să fie prelucrat și așternutul animalului, prin pulverizare cu produs insectoacaricid.

Contraindicații și precauții.

Contraindicat animalelor lactante, celor aflate în perioada de reconvalescență, cât și tineretului mai mic de 10 săptămâni. În caz de sensibilitate individuală (intoxicații), care este manifestată prin lacrimație, salivație abundentă, vomă și frisoane, animalul va fi spălat cu apă caldă și se vor administra preparate antihistaminice.

Nu este recomandat scăldatul animalului cu 3 zile până, și 3 zile după prelucrare. Păstrați recipientele bine închise. A se evita contactul cu ochii. A se evita aruncarea în mediul înconjurător. În timpul manipulării produsului se interzice de a fuma, a bea apă, a mânca. După utilizarea preparatului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

Condiții de păstrare. A se păstra numai în ambalajul original. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Separat de produsele alimentare și hrana animalelor. La temperatura 0 - 30°C, loc uscat, ferit de lumină.

Mod de prezentare. Flacon-picurător 5 ml, însoțit de prospectul de utilizare.

Producător. S.R.L. „Medicamentum”, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 026562246, e-mail:medicamentum@mail.ru.