

## Instrucțiune

pentru administrarea vaccinului Hexacativac  
contra pestei canine, parvovirozei, hepatitei infecțioase, adenovirozei și  
leptospirozei la câini.

### I. Informații generale

#### 1. Denumirea comercială – Hexacativac.

Denumirea internațională nepatentată : Vaccin contra pestei canine, parvovirozei, hepatitei, adenovirozei și leptospirozei – ( Hexacativac).

#### 2. Forma medicamentoasă: partea uscată – masă liofilizată, partea lichidă – suspensia injectabilă ( diluant pentru partea uscată).

Partea uscată a vaccinului se obține din virusul atenuat a pestei canine din tulpina „Rocborn”, liofilizat în mediu jelatino-zaharos.

Partea lichidă este obținută din parvovirusul canin, tulpina „D-1”, adenuvirusul canin de serotipul doi, tulpina „LT” și leptospirele din grupurile serologice *Icterohaemorrhagiae* tulpina „VGNKI - 2” și *Canicola* , tulpina „VGNKI – 3” cu adaos de formalină în calitate de inactivator și gel de hidroxid de aluminiu în calitate de adjuvant.

Se prezintă partea uscată a vaccinului, ca o masă amorfă, uscată, de culoare pal – gălbuie cu nuanță roz; partea lichidă – o suspensie omogenă de culoare roză, care în timpul păstrării formează un sediment gri-deschis ce dispare la agitare.

Partea uscată a vaccinului se ambalează câte 1 doză în flacoane de volum corespunzător, umplute cu gaz inert, ermetic închise cu dopuri din cauciuc și capace din aluminiu.

Partea lichidă a vaccinului este ambalată a câte 1 doză (2,2 cm<sup>3</sup>) în flacoane de volum corespunzător umplute cu gaz inert, ermetic închise cu dopuri de cauciuc și capace de aluminiu.

#### 3. Flacoanele cu vaccin sunt ambalate în cutii. În fiecare cutie este instrucțiune pentru administrare.

Cutiile cu vaccin sunt ambalate în lăzi sau alte cutii care asigură păstrarea și integritatea vaccinului. Termenul de păstrare este de 12 luni din data producerii, cu respectarea condițiilor. Vaccinul expirat se interzice spre administrare.

#### 4. Vaccinul se transportă și păstrează la loc uscat, la T<sup>0</sup>+2+10<sup>0</sup>C.

#### 5. A se păstra la loc inaccesibil pentru copii.

6. Conținutul flacoanelor fără etichetă, expirate, deteriorate, de culoare schimbată, cu impurități și vaccinul nefolosit timp de 30 minute de la deschidere, se rebutează, se decontaminează prin fierbere timp de 5 minute și se utilizează.

Utilizarea vaccinului decontaminat nu necesită respectarea anumitor măsuri de precauție.

### II. Particularități biologice

7. Vaccinul induce formarea imunității la câini față de pesta canină, parvoviroză, hepatită, adenoviroză și leptospiroză peste 21 de zile de la





administrarea cu rapel la căței și o singură administrare la câini adulți, timp de 12 luni.

Intr-o doză de vaccin conținutul de virus a pestei canine este nu mai puțin de  $10^{3,5}$  TCD<sub>50</sub>, parvovirus canin nu mai puțin de  $10^{3,0}$  GAE, adenovirus nu mai puțin de  $10^{3,0}$  GAE, leptospire din serotipul *Icterohaemorrhagiae* și *Canicola* nu mai puțin de  $3 \cdot 10^{8,0}$  celule microbiene.

Vaccinul este inofensiv, fără efect terapeutic.

### III. Mod de administrare

8. Vaccinul este destinat pentru imunizarea câinilor contra pestei canine, parvovirozei, hepatitei infecțioase, adenovirozei și leptospirozei.

9. Se interzice vaccinarea animalelor bolnave sau iepuizate, cu temperatura corpului ridicată, căței pînă la vîrsta de 60 zile și în perioada schimbării dinților, femelele în a doua jumătate a gestației,

10. Câinii se vaccinează de la vîrsta de 60 zile. Se administrează de două ori cu interval de 2-3 săptămîni, s/cutan sau i/muscular. Înainte de administrare, partea uscată a vaccinului se diluiază cu cea lichidă. Pentru a le dilua, în faconul cu partea uscată, cu o seringă sterilă se adaugă  $1,2 \text{ cm}^3$  din partea lichidă pentru un animal cu masa pînă la 5 kg și  $2,2 \text{ cm}^3$  pentru câini cu masa mai mare de 5 kg, se agită bine pînă la dizolvarea totală și obținerea unei suspensii omogene.

Următoarea vaccinare se efectuează după schimbarea dinților în aceeași doză.

Revaccinarea câinilor se efectuează anual.

Cu 10 zile înainte de vaccinare se efectuează dehelmintizarea câinilor.

Administrarea serurilor specifici și a imunoglobulinelor se stopează cu 2 săptămîni înainte de vaccinare.

Seringile și acele se sterilizează prin fierbere timp de 20 min. Sterilizarea cu substanțe chimice nu se permite. Se recomandă folosirea seringilor de unică folosință. Locul inoculării nu se dezinfectează.

11. Simptome de pestă canină, hepatită infecțioasă, adenoviroză, parvoviroză și leptospiroză în cazul supradozării nu au fost înregistrate. Poate apărea o mică umflătură care trece singură de la sine.


12. În rare cazuri după vaccinare dispare pofta de mîncare și apatie.

13. Se recomandă evitarea abaterilor de la schema de bază a vaccinărilor ceea ce poate duce la scăderea eficienței imunoprofilaxiei contra pestei canine, hepatitei infecțioase, adenovirozei, parvovirozei și leptospirozei. În cazul omiterii unei administrări se recomandă injectarea ei cît mai rapidă.

14. Administrarea conform instrucțiunii protejează de complicații. Se permite administrarea vaccinului concomitent cu vaccinul contra rabiei cu o seringă sterilă din partea opusă, s/cutan sau i/muscular.

15. În perioada formării imunității e important să se evite plimbările câinilor pe teritoriile unde sunt alte animale.

16. Perioada de așteptare pentru produsele de origine animală nu sunt stabilite.





#### IV. Regulile de igienă personală

17. În timpul lucrului cu vaccinul e necesar de respectat regulile de igienă personală prevăzute în timpul lucrului cu preparate de uz veterinar.
18. Persoanele ocupate în vaccinarea câinilor e necesar să fie îmbrăcate în haine de protecție ( bonetă, halat, mănuși), locul de lucru să fie dotat cu trusă medicală.
19. În cazul nimeririi accidentale a vaccinului pe suprafața pielii sau a tunicilor mucoase se recomandă spălarea lor din abundență cu apă. În caz de scurgere, podeaua se prelucrează cu soluție de 5% de cloramină sau alt dezinfectant. În cazul administrării accidentale omului , locul inoculării se prelucrează cu alcool de 70% și se adresează în instituție medicală.
20. Unitatea producătoare: ZAO „ Vetzveroțentr”, 129337, Moscova, Hibinskii pr. 2

Odată cu aprobarea instrucțiunii date , cea din 29 decembrie 2006 își pierde puterea.

Imprtator în R. Moldova: SRL „ Zoofaramagro”, m.Chișinău, str. Camenița 4A, tel/fax +373022855-071; tel +373 022855-073

