

Instrucțiune

pentru administrarea serului contra pestei canine, hepatitei infecțioase, adenovirozei și parvovirozei la câini.

Imunovet 3Sn

I. Informații generale

1. Denumirea comercială Imunovet 3Sn.

Denumire internațională nepatentată – ser contra pestei canine, hepatitei infecțioase, adenovirozei și parvovirozei la câini Imunovet 3Sn.

2. Forma medicamentoasă - soluție injectabilă.

Imunovet 3Sn este obținut din sânge de cai, hiperimunizați cu antigeni virali a agenților patogeni de pestă canină, hepatită infecțioasă, adenoviroză și parvoviroză. Serul conține anticorpi neutralizatori ai virusurilor bolilor susnumite.

Imunovet 3Sn se prezintă ca o soluție opalescentă, de culoare pal-gălbuie.

Serul se produce ambalat a câte 2,0 cm³ (1 doză); 10,0 cm³ (5 doze); 20,0 cm³ (10 doze) în flacoane (fiole) de volum corespunzător. Flacoanele se închid ermetic cu dopuri de cauciuc și capace de aluminiu, fiolele sunt termosudate.

3. Flaconele (fiolele) se ambalează în cutii. Fiecare cutie cu preparat conține o instrucțiune pentru administrare.

Cutiile cu ser se ambalează în lăzi de carton.

Valabilitatea Imunovet-ului 3Sn – 24 ore din data producerii cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare. Preparatul expirat nu se administrează. În timpul păstrării la T⁰+2+10⁰C este posibilă apariția sedimentului sau fulgilor(crioproteine), care dispar la agitare și încălzire pînă la temperatura corpului.

4. Imunovet 3Sn se păstrează și se transportează la T⁰+2+10⁰C.

5. A se păstra în locuri inaccesibile pentru copii.

6. Flacoanele (fiolele) cu preparat dar fără etichetă, expirate, deteriorate, de culoare schimbată, cu impurități și soluția nefolosită timp de 4 ore de la deschidere se rebutează și se utilizează.


Utilizarea preparatului nu necesită respectarea anumitor reguli de securitate.

II. Particularități biologice

7. Imunovet 3Sn induce imunitate pasivă și asigură fixarea de către anticorpi a agenților patogeni a pestei canine, hepatitei infecțioase, a denovirozei și parvovirozei astfel acționînd terapeutic în caz de boală. La administrarea preventivă, nivelul de anticorpi atinge cota de protecție peste 12-24 ore de la injectarea s/cutană sau i/musculară. Imunitatea pasivă se menține timp de pîmă la 15 zile. La expirarea termenului limită, pentru inducerea imunității active , animalul se vaccinează.

III. Mod de administrare

8. Imunovet 3Sn se indică pentru tratamentul și profilaxia pestei canine, hepatitei infecțioase, adenovirozei și parvovirozei la câini.



9. Contraindicații nu sunt.

10. Serul Imunovet 3Sn se administrează s/cutan sau i/muscular. În timpul administrării e important să fie respectate regulile de septică și aseptică. Acele și seringile se sterilizează prin fierbere sau se folosesc seringi și ace de unică folosință. Pentru fiecare animal se folosește ac aparte. Locul inoculării se prelucrează cu alcool de 70%.

Flacoanele (fiolele) cu preparat, înainte de administrare se agită și se încălzesc pînă la temperatura corpului.

În scop preventiv și curativ, cîinilor cu masa pînă la 5 kg – se administrează 2,0 cm³, de la 5 pînă la 20 kg – 4,0 cm³, mai mult de 20 kg – 6,0-8,0 cm³. În cazuri grave, administrațiile se repetă la 10-12 ore, de 3-4 ore. Serul se administrează fracționat (mai întîi 0,5 cm³ și peste 30 min., în lipsa simptomelor de anafilaxie , restul volumului) sau concomitent cu preparate desensibilizante (suprastin, dimedrol, ș., a.). Terapia cu ser Imunovet 3Sn e important de combinat cu terapie simptomatică.

11. Cazuri de supradozare nu snt înregistrate.

12. În rare cazuri, serul Imunovet 3Sn poate provoca reacție alergică. În astfel de cazuri, administrarea se stopează și se recurge la administrarea preparatelor antihistaminice și simptomatice.

13. E important să fie evitate devieri de la schema de bază de administrare a preparatului.

14. La administrarea preparatului conform instrucțiunii, complicații și reacții adverse nu apar.

15. Se interzice administrarea preparatului Imunovet 3Sn, concomitent cu vaccinul contra peștei canine, hepatitei infecțioase, adenovirozei și parvovirozei, ca și cu preparate imunosupresoare.

16. Termen de așteptare pentru produsele de origine animală în urma administrării preparatului dat nu sunt stabilite.

IV. Regulile de igienă personală

17. În timpul lucrului cu serul Imunovet 3SN, e important să fie respectate regulile de igienă personală și tehnica securității, prevăzute în timpul lucrului cu preparate de uz veterinar.

18. Toate persoanele ocupate în cîmpul lucrului cu Imunovet 3Sn trebuie să fie îmbrăcate în haine de protecție. Locul de muncă trebuie să fie dotat cu trusă medicală.

19. În cazul nimeririi serului pe suprafața pielii sau tunicile mucoase, e important acestea imediat să fie spălate cu apă din abundență. În cazul injectării accidentale , locul se prelucrează cu alcool de 70% și se adresează la instituție medicală după consultație.

20. Unitatea producătoare : ZAO” Vetzverocentr”, 129337, Moscova, Hibinskii pr., 2

Odată cu aprobarea instrucțiunii date, cea din 30 iunie 2006 își pierde puterea.

