

## **Instrucțiune**

pentru administrarea imunoglobulinei contra  
panleucopeniei pisicilor – Imunovet 1IN

### **I. Informație generală**

1. Denumirea comercială Imunovet 1 IN.

Denumire nepatentată – imunoglobulină contra panleucopeniei pisicilor  
Imunovet 1IN.

2. Forma medicamentoasă – soluție injectabilă.

Imunovet 1In se fabrică din sânge de cai, hiperimunizați cu antigenul viral a panleucopeniei pisicilor. Imunoglobulina conține anticorpi față de agentul patogen a panleucopeniei pisicilor în titre nu mai mici 1:256 ( în RIHA).

Imunovet 1IN – imunoglobulina contra paneucopeniei pisicilor, conține anticorpi virusneutralizatori față de agentul ptogen a bolii date.

Se prezintă ca o soluție incoloră, opalescentă.

Imunoglobulina se ambalează a câte 2,0 cm<sup>3</sup> (1 doză); 10,0cm<sup>3</sup> (5 doze ); 20,0cm<sup>3</sup>(10 doze) în flacoane ( fiole) cu volum corespunzător. Flacoanele sînt închise ermetic cu dopuri de cauciuc și capace din aluminiu, fiolele sunt termosudate.

3. Flacoanele ( fiolele) cu imunoglobulină sunt ambalate în cutii. Fiecare cutie cu preparat conține instrucțiune pentru administrare.

Cutiile de carton sunt ambalate în lăzi de carton.

Valabilitatea Imunovet-ului 1IN – 24 luni din data producerii cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare. Preparatul cu termenul expirat se interzice spre administrare. În timpul păstrării la T<sup>0</sup>+2+10<sup>0</sup>C pot apărea fulgi ( așa numiții crioproteine), care se dizolvă ușor la agitare și încălzire pînă la temperatura corpului.

4. Imunovet 1IN se păstrează și se transportă la loc uscat și ferit de lumină, la T<sup>0</sup>+2+10<sup>0</sup>C.

5 Se păstrează preparatul la loc inaccesibil pentru copii.


6 Flacoanele fără etichetă, cu termenul expirat, deteriorate, cu culoarea sau consistența schimbată, cu mpurități și soluția nefolosită timp de 4 ore de la deschidere, se rebutează și se utilizează.

Utilizarea preparatului nu necesită măsuri speciale de precauții.

### **II. Particularități biologice**

7. Imunovet 1IN induce imunitate pasivă, asigurînd fixarea antigenului viral de către anticorpii din Imunovet, în așa fel manifestîndu-și efectul terapeutic în caz de îmbolnăvire. În cazul administrării preventive, nivelul anticorpilor în sânge atinge cota de protecție peste 12-24 ore de la administrea s/cutană sau i/musculară. Imunitatea pasivă se menține pînă la 15 zile. La expirarea termenului limită, pentru inducerea imunității active, animalele se vaccinează.

### **III. Mod de administrare**





8. Imunovet IN se indică pentru tratamentul și profilaxia panleucopeniei pisicilor.
9. Contraindicații nu au fost stabilite.
10. Preparatul Imunovet 1In se administrează subcutan sau i/muscular.  
În timpul lucrului cu imunoglobulina e necesar de respectat regulile de septică și aseptică. Acele și seringile se sterilizează prin fierbere, sau se folosesc seringi sterile de unică folosință, pentru fiecare animal ac parte. Locul inoculării se prelucrează cu alcool de 70%.
- Flacoanele ( fiolele) cu preparat, înainte de administrare se încălzesc pînă la  $T^0$  corpului și se agită minuțios.
- Cu scop preventiv și curativ, pisicilor li se administrează cîte  $2,0\text{cm}^3$ . În cazuri grave , injectarea se repetă la interval de 10-12 ore, de 3-4 ori.
- Imunoglobulina se administrează fracționat ( mai întîi  $0,5\text{ cm}^3$  și peste 30 minute în cazul lipsei reacțiilor anafilactice restul volumului ) sau se administrează concomitent cu preparate desensibilizante ( dimedrol, suprastin ș.a.). Tratamentul cu imunoglobulina Imunovet 1IN e recomandabil de combinat cu remedii simptomatice.
11. Cazuri de supradozare nu au fost înregistrate.
12. În rare cazuri imunoglobulina poate provoca reacție alergică. În așa caz administrarea se stopează și se recurge la administrarea preparatelor antihistaminice.
13. E important să fie respectată schema de administrare a imunoglobulinei.
14. În cazul administrării conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu apar.
15. Se interzice administrarea preparatului concomitent cu vaccinul contra panleucopeniei ca și cupreparate imunosupresoare.
16. Termen de așteptare pentru produsele de origine animală nu sunt stabilite.

#### **IV. Regulile de igienă personală**

17. În timpul lucrului cu imunoglobulina e important să se respecte regulile de igienă personală, a tehnicii sacurității, prevăzute pentru lucru cu preparate de uz veterinar.
18. Toate persoanele ocupate în lucru cu imunoglobulina e necesar să fie îmbrăcate în haine de protecție. La locul de lucru e necesar să fie dotat cu trusa medicală.
19. În cazul nimeririi accidentale a imunoglobulinei pe tunicile mucoase sau piele, se recomandă spălarea din abundență cu apă. La administrare accidentală omului, locul inoculării se prelucrează cu alcool etilic de 70% și se adresează în instituție medicală.
20. Unitatea producătoare : ZAO „ Vetzveroțentr”, 129337, or.Moscova, pr.Hibinskii 2

Odată cu aprobarea instrucțiunii date, se anulează instrucțiunea aprobată de ROSSELHOZNADZOR în 30 iunie 2006.

Importator în R. Moldova: SRL „Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4A  
Tel/fax +373022855-071; +373022 855 -073

