

**PROSPECT**  
**Neocolipor**

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare:

MERIAL  
29 avenue Tony Garnier  
69007 LYON  
FRANȚA

Producător pentru eliberarea seriei:

MERIAL  
Laboratoire Porte des Alpes  
Rue de l'Aviation  
F-69800 SAINT PRIEST  
FRANȚA

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Neocolipor suspensie injectabilă.

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

per doză de 2 ml:

E.coli adezina F4 (F4ab, F4ac, F4ad), minimum .....	2.1 U SA.*
E.coli adezina F5, minimum.....	1.7 U SA.*
E.coli adezina F6, minimum.....	1.4 U SA.*
E.coli adezina F41, minimum.....	1.7 U SA.*

\*: 1 U SA.: cantitate suficientă pentru obținerea unui titru de anticorpi aglutinant de 1 log<sub>10</sub> la porcii de guinea.

Adjuvant:

Aluminiu (sub formă de hidroxid).....	1.4 mg
---------------------------------------	--------

**4 INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Vaccin adjuvant inactivat pentru reducerea enterotoxicozelor neonatale la purcei, cauzate de tulpinile *E coli*, care exprimă adezinele F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 și F41.

**5. CONTRAINDICAȚII**

Nu există

**6. REACȚII ADVERSE**

Vaccinarea poate provoca o hipertermie ușoară (mai puțin de 1.5° timp de maxim 24 de ore).

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

**7. SPECII ȚINTĂ**



Suine (scroafe și scrofite)

## **8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE**

O doză de 2ml conform cu următoarea schemă de vaccinare:

### Vaccinarea primară:

Prima injecție: 5 până la 7 săptămâni înainte de fătare  
A doua injecție: 2 săptămâni înainte de fătare.

### Revaccinarea:

1 injecție cu 2 săptămâni înainte de fiecare fătare.

## **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Injecție intramusculară la nivelul gâtului, în zona din spatele urechii.

A se agita bine înainte de utilizare.

A se utiliza seringi și ace sterile. A se administra utilizând procedurile aseptice obișnuite.

## **10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la 2°C - 8°C, protejat de lumină. A nu se congela.

Durata de valabilitate a flaconului desigilat: 3 ore

## **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

Deoarece protecția purceilor se asigură prin ingerarea colostrului, fiecare purcel trebuie să consume o cantitate suficientă de colostrum în primele 6 ore de viață.

A se vaccina numai animalele sănătoase.

A nu se administra simultan cu alte produse medicinale.

Informații referitoare la compatibilitatea acestui vaccin cu oricare altele nu sunt disponibile. Motiv pentru care siguranța și eficacitatea acestui produs în cazul în care se utilizează cu un alt vaccin (fie utilizat în aceeași zi sau nu ) nu a fost demonstrată.

În cazul unei autoinjectări accidentale cu acest produs, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul sau eticheta produsului.

A se spăla și dezinfecta mâinile după administrare.

Nu au fost observate reacții secundare la administrarea unei doze duble față de cea recomandată.

A nu se combina cu nici un alt vaccin.

## **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.



#### 14. DATA LA CARE A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Informații detaliate referitoare la acest produs sunt disponibile pe website-ul Agenției Europene a Medicamentelor (EMA) : <http://emea.europa.eu/>

#### 15. ALTE INFORMAȚII

Vaccinul, în adjuvant de hidroxid de aluminiu, conține tulpinile inactivate de *E.coli*, care exprimă adevinele F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 și F41, responsabile de producerea enterotoxicozelor neontale la porcei. La scroafe și scrofite, vaccinul induce o seroconversie specifică a animalelor vaccinate; porceii sunt imunizați în mod pasiv prin ingestia colostrului și a laptelui care conține anticorpi specifici ai adevinelor.

Cutie cu 5-doze flacon de 10 ml (flacon din sticlă tip I cu dop de cauciuc).

Cutie cu 10-doze flacon de 20 ml (flacon din sticlă tip I cu dop de cauciuc).

Cutie cu 25-doze flacon de 50 ml (flacon din sticlă tip I cu dop de cauciuc).

Cutie cu 50-doze flacon de 100 ml (flacon din sticlă tip I cu dop de cauciuc).

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Produs medicinal veterinar supus prescripției.

ANEXA I

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI