

Nobivac® Rabies

VACCIN ANTIRABIC

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

Descriere

Nobivac® Rabies este un vaccin inactivat adsorbit pe fosfat de aluminiu prezentat sub formă de suspensie apoasă.

Compoziție

Nobivac® Rabies conține o cultură inactivată de virus rabic clonat din tulpina Pasteur RIV care induce cel puțin 2 U.I. la testul de potență. Virusul este cultivat pe linia celulară CT clona BHK 21 și este inactivat cu betapropiolactonă. Conservant: tiomersal 0,01%.

Proprietăți imunologice

Vaccinul asigură un nivel înalt de anticorpi după 3 săptămâni de la administrare. După această perioadă se păstrează un nivel de anticorpi mai mult sau mai puțin constant, dar suficient de ridicat pentru asigurarea protecției.

Indicații

Pentru imunizarea activă a câinilor, pisicilor, bovinelor, ovinelor, caprinelor, dihorilor, vulpilor, ecvinelor și în principiu, a tuturor mamiferelor sănătoase, împotriva rabiei.

Contraindicații

Nu se vaccinează animalele bolnave.

Efecte adverse

După administrarea subcutanată, ocazional, poate să apară la locul de inoculare un nodul palpabil cu caracter pasager.

Utilizare în timpul gestației și lactației

Vaccinul poate fi utilizat în timpul gestației.

Doze și mod de administrare

Fiecare animal se vaccinează subcutanat sau intramuscular cu 1 ml (1 doză) vaccin. Schema de vaccinare recomandată:

	câini, pisici	dihori	bovine, cabaline
Prima vaccinare la vârsta de peste:	3 luni *	3 luni *	6 luni *
Revaccinări la fiecare:	3 ani **	1 an **	2 ani **
Calea de administrare	i.m. sau s.c.	s.c.	i.m.

Prima vaccinare poate fi aplicată la o vârstă mai timpurie dar atunci trebuie repetată la vârsta de 3 sau 6 luni, în funcție de specie.

****Intervalul recomandat pentru revaccinare, stabilit pe baza rezultatelor investigațiilor serologice și a experimentelor de control. Reglementările locale în vigoare pot impune revaccinări mai timpurii.**

Perioadă de așteptare

Zero zile

Incompatibilități și interacțiuni

Nu se amestecă cu alte vaccinuri sau substanțe, în afară de vaccinurile din gama Nobivac: Nobivac DHPPi, Nobivac DHP, Nobivac Puppy DP, Nobivac Parvo-C, Nobivac Tricat, Nobivac Lepto.

Precauții

Înainte de utilizare, vaccinul va fi lăsat să ajungă la temperatura camerei (15-25°C). Flaconul se agită pentru omogenizare. Se va folosi instrumentar steril pentru vaccinare.

Supradozare

Se va evita supradozarea.

Păstrare

La temperatura de 2-8°C (la frigider) și ferit de îngheț.

Flacoanele de 10 doze, deschise, se utilizează în decursul unei zile de lucru.

Valabilitate

4 ani de la data fabricației

Prezentare

Cutie cu 10 flacoane x 1 doză sau cutie cu 10 flacoane x 10 doze. Flacoane din sticlă, clasa hidrolitică tip II (Ph Eur.), închise cu dop din cauciuc halogenobutilic și sigilate cu capsulă de aluminiu codificată.

Precauții pentru produsul neîntrebuințat și ambalaje

Nu se impun precauții speciale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Lot/ Data expirării: vezi ambalaj.

Nr. și dată înregistrare:

Producător- Ambalator:

MSD Animal Health, Boxmeer-Olanda.