

Penstrep- 400

Compoziție: Procain penicilin G 200000 ME

Dihidrostreptomicin sulfat 200 mg

Excipient 1 ml

Acțiune: Amestecul de procain penicilină G și dihidrostreptomocin sulfat are o acțiune sinergică.

Procain penicilin G este o penicilină cu un spectru îngust de activitate bactericidică asupra bacteriilor Gram pozitive:

Clostridium, Campylobacter, Corynebacterium, Erysipelothrix, Haemophilus, Listeria, Pasteurella, penicillinase negative Staphylococcus și Streptococcus spp.

Dihidrostreptomicin sulfat este un antibiotic care aparține grupe aminoglucozidelor cu acțiune bactericidă asupra bacteriilor Gram negative:

E.coli, Klebsiella, Pasteurella, Salmonella, Staphylococcus spp.

Indicații:

Se administrează la prevenirea și combaterea artritelor, mastitelor, infecțiilor gastrointestinale, respiratorice, urogenitale sensibile la procain penicilin G și dihidrostreptomicin sulfat ca :

Clostridium, Campylobacter, Corynebacterium, Erysipelothrix, Haemophilus, la viței, capre, oi, porcine.

Contraindicații.

Reacția alergică la penicilin, procain, aminoglucozide.

Nu se vor trata animalele cu insuficiență renală gravă, hepatice.

Nu se administrează concomitent cu alte preparate – tetraciclin, chloramfenicol, macrolide.

Precauții:

Ototoxicoz, neurotoxicoz, nefrotoxicoz.

Reacția alergică.

Administrare și dozare:

Se administrează intramuscular:

Vițe, porcine: 1 ml/20 kg masă vie, în decurs de 3 zile.

Viței, gaprine, ovine, porci : 1 ml/10 kg masă vie, în decurs de 3 zile.

Nu se administrează mai mult de 20 ml bovinelor, mai mult de 10 ml porcilor și mai mult de 5 ml vițelilor, ovinelor, caprinelor într-un singur loc injectat.

Înainte de administrare se ajită bine.

Țimp de așteptare carne 21 zile.

lapte 3 zile.

Răunchi 45 zile

Mod de prezentare:

Flacon 100 ml