

**PROSPECT**  
**Poulvac IB Primer**

**Vaccin viral viu, liofilizat împotriva Bronșitei Infecțioase pentru puii de găină**

**1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE  
COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE  
FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERILOR DE  
PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE**

Deținătorul autorizației de comercializare:

**Zoetis Belgium SA**  
Rue Laid Burniat 1,  
1348 Louvain-la-Neuve,  
Belgia

Producător pentru eliberarea seriei:

**Pfizer Olot, S.L.U.**  
C/Camprodon s/n "La Riba"  
17813 Vall de Bianya  
Girona  
Spain

**2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR**

Poulvac IB Primer  
Liofilizat pentru administrare prin pulverizare, picături oculare sau prin intermediul apei de băut, consecutiv reconstituirii în apă pentru puii de găină

**3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR  
INGREDIENTE (INGREDIENTI)**

**Substanțe active:**

Virus viu atenuat al Bronșitei Infecțioase Aviare, tulpina H120:  $10^{3.0} - 10^{5.4} \text{EID}_{50}$

Virus viu atenuat al Bronșitei Infecțioase Aviare, tulpina Clona  
D274  $10^{3.0} - 10^{5.4} \text{EID}_{50}$

**4 INDICAȚIE (INDICAȚII)**

Pentru imunizarea activă împotriva Bronșitei Infecțioase.

Instalarea imunității: 27 zile după vaccinare

Durata imunității: 16 săptămâni.



## 5. CONTRAINDICAȚII

Nu vaccinați păsările bolnave.

## 6. REACȚII ADVERSE

Pot fi observate simptome respiratorii tranzitorii, ușoare.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

## 7. SPECII ȚINTĂ

Puii de găină

## 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se administrează o doză de vaccin pe pasăre prin pulverizare, prin intermediul picăturilor oculare sau în apa de băut. Cantitatea de apă ce va fi folosită depinde de metoda de administrare:

Pentru administrarea prin pulverizare: 0,15 până la 0,5 litri pentru 1000 de păsări, în funcție de dispozitivul de pulverizare și de acomodarea păsărilor.

Dispozitivul de pulverizare folosit trebuie setat la o dimensiune a picăturii de 0,12 până la 0,15 mm în diametru. Distanța de la capul pulverizatorului la pasăre trebuie să fie de aproximativ 50 cm.

Pentru administrare prin picături oculare: 50 ml pentru 1000 de păsări.

O picătură (0,05 ml) de soluție vaccinală este administrată la nivelul unui ochi. Pentru aceasta, capul animalului trebuie fixat pentru a nu permite picăturii să se scurgă. 1000 doze de vaccin sunt dizolvate în 50 ml apă.

Pentru administrarea în apa de băut: În funcție de vârsta păsărilor: Cantitatea de apă în litri pentru 1000 de pui de găină trebuie ajustată în concordanță cu vârsta în zile a puilor de găină (până la un maximum de 40 de litri).

Apă ce conține un nivel ridicat de clor sau ioni de metal nu trebuie folosită, iar conductele și tubulatura trebuie să fie curățate riguros și libere de urme de dezinfectante și detergenți. Se recomandă adăugarea de proteine protectoare sub forma pulberii de lapte smântânit (2 g pe litru de apă) sau lapte smântânit (1 litru pe 50 litri de apă) în apă.

Păsările trebuie private de apă cu 2 ore înainte de vaccinare. Pentru vaccinare, folosiți tot atâția litri de apă ca vârsta păsărilor în zile, pentru 1000 de păsări, până la un maximum de 40 de litri, așa cum este indicat mai sus.

Pregătiți cantitatea de vaccin ce va fi folosită în decurs de 2 ore. Îndepărtați capsă etanșeizată și dopul flaconului de vaccin și suspendați vaccinul în cantitatea corespunzătoare de apă și amestecați cu grijă. Trebuie avută grijă în a se elibera complet ampula și a se administra vaccinul imediat. Asigurați-vă că păsările nu au acces la apă netratată până când apa tratată nu a fost consumată.



Schema de vaccinare:

Broileri: vaccinare în prima zi de viață.

Alte păsări: vaccinare în prima zi de viață sau în cursul săptămânii a 3-a sau a 4-a de viață pentru protecția imediată a tineretului aviar, urmată de vaccinarea cu un vaccin inactivat.

Vârsta minimă: o zi.

## **9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

Cu o zi înainte și după vaccinare, nici un medicament sau dezinfectant nu trebuie aplicat puilor de găină.

În timpul vaccinării, nu se administrează păsărilor apa netratată, până când apa cu soluție vaccinală nu a fost consumată. Apa de băut trebuie să fie liberă de substanțe dezinfectante.

## **10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Zero zile.

## **11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra și transporta în condiții de refrigerare (2 °C - 8 °C).

A se proteja de lumină.

A nu se congela.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

Perioada de valabilitate după reconstituire conform indicațiilor: 2 ore.

## **12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

*Precauții speciale pentru utilizare la fiecare specie țintă:*

Tulpina vaccinală se poate răspândi la pui de găină nevaccinați. Testele de siguranță și de revenire la virulență au demonstrat că tulpina vaccinală este sigură pentru pui de găină. Este recomandat să se vaccineze toate păsările din locație în același timp.

Trebuie evitată expunerea vaccinului la căldură și/ sau lumină solară directă.

*Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:*

În timpul vaccinării conform metodei prin pulverizare, utilizatorul trebuie să își protejeze cel puțin ochii cu ochelari de protecție și nasul și gura cu o mască împotriva prafului. O mască cu o circulație filtrată a aerului poate fi folosită în schimb.

*Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:*

Siguranța produsului medicinal veterinar nu a fost stabilită pe durata perioadei de ouat.

*Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune:*



Nu există informații disponibile referitoare la siguranța și eficacitatea acestui vaccin când este utilizat cu alt produs medicinal veterinar. Decizia utilizării acestui vaccin înainte sau după oricare alt produs medicinal veterinar va fi stabilită de la caz la caz.

*Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi):*

O supradoză nu afectează reacția normală la vaccinare (simptome respiratorii tranzitorii, ușoare).

*Incompatibilități:*

A nu se amesteca cu nici un alt produs medicinal veterinar.

### **13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

### **14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL**

### **15. ALTE INFORMAȚII**

Vaccinul este furnizat în cantități de 1000, 2500 și 5000 doze (volum de 4 ml).

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.

#### **Zoetis România SRL**

Willbrook Platinum Business & Convention Center

Sos. Bucuresti Ploiesti, nr. 172-176, Corp B, Etaj 5,

Sector 1, 013686, București, România

Tel: + 40 21 207 17 70

Fax: + 40 21 207 17 71

The Zoetis logo, featuring the word "zoetis" in a lowercase, bold, sans-serif font. The "z" is stylized with a horizontal line through it. A small trademark symbol (TM) is located to the upper right of the "s".