

Instrucție de utilizare
Virus-vaccin (ACB) tulpina "K" contra pestei porcine clasice, liofilizată.

Denumirea preparatului veterinar

Virus-vaccin (ACB) tulpina "K" contra pestei porcine clasice, liofilizată.

Compoziția

Splină omogenizată și sînge de epure defibrinat ce conține virus în raport 1:15 cu conținutul virusului pestei porcine clasice tulpina „K” nu mai puțin de $3,0 \text{ ID}_{50}/2 \text{ cm}^3$.

Forma farmaceutică

Pastilă sau masă poroasă uscată de culoare de la roșu la roșu-închis.

Proprietăți imunobiologice

Este destinată pentru imunizarea profilactică a porcilor contra pestei porcine clasice pe calea introducerii intramusculare. Imunitatea forțată se formează la a 10-14 zi după vaccinare, durată 1 an.

Specii de animale

porci.

Indicații pentru utilizare

Se utilizează pentru imunizarea profilactică și la necesitate a animalelor contra pestei porcine clasice în gospodării favorabile, nefavorabile și care prezintă pericol de îmbolnăvire cu această maladie. La apariția pestei porcine în complexe de porci sau ferme de porci, imunizării se supun animalele clinic sănătoase cu o doză de 10 ori mai mare decît doza recomandată cu permisiunea Comitetului de Stat de Medicină Veterinară.

Contraindicații

Se interzice utilizarea vaccinului după expirarea termenului de valabilitate sau nerespectarea regimului de temperatură la păstrare. A nu se utiliza la animalele bolnave.

Precauții la utilizare

Vaccinul se dizolvă în apă fiartă răcită sau în soluție fiziologică sterilă, respectînd regulile aseptice și protejarea de razele directe ale soarelui, din calculul 2 cm^3 solvent la 1 doză de vaccin. Se utilizează vaccinul timp de 4 ore după diluare. Vaccinul se introduce intramuscular în regiunea gîtului sau suprafața interioară a șoldului în volum de 2 cm^3 , utilizînd pentru fiecare animal un ac steril separat. Vaccinării se supun doar animalele sănătoase clinic. Vaccinarea se petrece sub controlul medicului veterinar.

Flacoanele cu vaccin fără marcaj, cu crăpături, corpuri străine, de asemenea flacoane cu vaccin neutilizat timp de 4 ore după diluare – se decontaminează prin fierbere timp de 1 oră.

Interacțiunea cu alte preparate

A nu se utiliza preparate antivirale și antibiotice cu 10 zile înainte de vaccinare și 10 zile după, de asemenea nu se recomandă tratarea animalelor contra bolilor infecțioase și invazive.

Indicații speciale în perioada sarcinii și lactației

Scroafele (indiferent de termenul sarcinii) în gospodării nefavorabile și cu pericol de îmbolnăvire cu pesta porcină se vaccinează o singură dată cu o doză de 2 cm^3 , în alte gospodării scroafele mai bine de vaccinat nu mai tîrziu cu 20-30 zile pînă la însămințare.

Metoda de utilizare și dozajul

Pentru imunizarea profilactică contra pestei porcine, porcii se vaccinează 1 dată în an cu o doză de 2 cm^3 , purceii obținuți de la scroafele vaccinate contra pestei porcine se vaccinează la vîrsta de 40-45 zile o dată cu doza de 2 cm^3 .

În gospodăriile nefavorabile la pesta porcină porcii se vaccinează după următoarea schemă:

- Scroafe – cu 20-30 zile pînă la însămințare o dată în an cu doza 2 cm^3 (diluată 1:100);
- Vieri - o dată în an cu doza 2 cm^3 ;
- Purceii la vîrsta de 40-45 zile și se revaccinează la vîrsta de 85-100 zile, apoi o dată în an cu doza 2 cm^3 .

Reacții adverse

Timp de 14 zile după vaccinare se duc observații clinice la animalele vaccinate.



La animalele sănătoase este posibilă creșterea temperaturii corpului cu un grad la ziua 3-7 după vaccinare la o stare satisfăcătoare și păstrarea poftei de mâncare.

În gospodăriile nefavorabile după vaccinare este posibilă îmbolnăvirea și decesul acelor animale, care deja au fost infectate cu virusul pestei porcine și s-au aflat în perioada de incubare a bolii.

Precauții speciale pentru persoane și personalul tehnic care administrează vaccinul

Personalul tehnic la administrarea vaccinului trebuie să fie îmbrăcat în haine speciale.

Precauții speciale de securitate la manipularea cu vaccinul neutilizat, metode de decontaminare și eliminare

Flacoanele cu vaccinul neutilizat timp de 4 ore după diluare – se scoate din uz și se decontaminează prin fierbere timp de 1 oră. Locul turnării vaccinului se tratează cu soluție dezinfectantă (Vircon-C, soluție hidroxid de sodiu, apă oxigenată ș.a.)

Termenul de valabilitate

12 luni din data fabricării. Din momentul deschiderii vaccinului se utilizează în timp de 4 ore după diluare, apoi se scoate din uz și se decontaminează prin fierbere timp de 1 oră.

Condiții de păstrare și transportare

Într-o încăpere întunecată, uscată la temperatura nu mai mare de 10° C. Vaccinul se transportă cu toate tipurile de transport în corespundere cu Regulile de transportare a mărfurilor și bagajului, ușor alterabile și acționează asupra acestui tip de transport.

Ambalaj

Flacoane din sticlă neutră cu volumul (2,5,10,15,20) cm³ și astupate cu dopuri de sticlă, armate cu dopuri din aluminiu. Pe fiecare flacon se încheie etichetă: din hârtie pe care se indică datele conform DSTU 4614: denumirea vaccinului; numărul seriei; numărul certificatului de înregistrare, denumirea și adresa producătorului; termenul de valabilitate; condiții speciale de păstrare. Flacoanele din sticlă cu vaccin cu volumul (2,5,10,15,20) cm³ câte 10-30 buc. se ambalează în cutii de carton. Cutiile cu vaccin se ambalează în lăzi cu masa brută nu mai mult de 25 kg.

Condiții de eliberare

Pe bază de prescripție medicală.

Denumirea și adresa titularului certificatului de înregistrare

Întreprinderea de Stat din Herson – fabrica biologică, Ucraina, 73011, or. Herson, str. Admiral Macarov, 9.

Denumirea și adresa producătorului

Întreprinderea de Stat din Herson – fabrica biologică, Ucraina, 73011, or. Herson, str. Admiral Macarov, 9.

