

INSTRUCȚIUNE

pentru administrarea vaccinului Vacderm contra dermatofitozelor la animale.

I. Informații generale

1. Denumirea comercială – Vacderm .

Denumirea internațională nepatentată a vaccinului – vaccin pentru profilaxia și tratamentul dermatofitozelor -Vacderm.

2. Forma medicamentoasă – soluție injectabilă. Vaccinul este obținut din celule de dermatofiți a *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* și *Trichophyton mentagrophytes*, crescuți pe medii selective cu adaos de stabilizator a formalinei – 0,3%.

Se prezintă ca o suspensie omogenă de culoare galben-marou.

Vaccinul este ambalat câte 1,0; 2,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0 și 450,0 doze , ceea ce corespunde la (1,0; 2,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0; 200,0; 450,0 cm³) în flacoane de volum corespunzător, ermetic închise cu dopuri de cauciuc și capace din aluminiu sau fiole termosudate.

3. Flacoanele (fiolele) cu vaccin se ambalează în cutii. În fiecare cutie este instrucțiune pentru administrare.

Cutiile cu vaccin se ambalează în lăzi de carton(sau alt ambalaj secundar).

Valabilitate – 12 luni cu respectare condițiilor de păstrare și transportare.

Vaccinul cu termenul expirat se interzice spre administrare.

4. Se păstrează și se transportă vaccinul, la loc uscat, ferit de lumină, la $T^{0}+2+10^{0}C$.
5. A se păstra la loc inaccesibil pentru copii.
6. Flacoanele (fiolele) fără etichetă, cu termen expirat, deteriorate, de culoare sau consistență schimbată a conținutului, cu impurități, ca și vaccinul rămas nefolosit timp de 30 min. de la deschidere, se rebutează. Vaccinul Vacderm nu necesită decontaminare.

Utilizarea vaccinului nu necesită respectarea anumitor precauții.


II. Particularități biologice

7. Vaccinul induce imunitate la pisici, câini, animale de blană și iepuri față de dermatofitoze peste 25-30 zile de la administrarea cu rapel la interval de 10-14 zile. Imunitatea se menține timp de 12 luni.

Un dozaj de vaccin conține nu mai puțin de 30-50 mln/cm³ de elemente fungice. Vaccinul este inofensiv, posedă acțiune preventivă și curativă.

III. Mod de administrare

8. Vaccinul este indicat pentru imunizarea cu scop preventiv și curativ contra microsporiei și trihifiției pisicilor, câinilor, animalelor de blană și iepurilor.
9. Se interzice vaccinarea animalelor cu temperatura corpului ridicată, în adoua



jumătate a gestației ca și a celor bolnave de boli infecțioase și parazitare.

Animalele slăbite sau bolnave se tratează de bolile curente și după însănătoșire se vaccinează contra dermatofitozelor.

10. Vaccinul se administrează i/muscular, de două ori. Injectarea se efectuează în membrele posterioare opuse, în regiunea șoldului, cu interval de 10-14 zile:

- Pisicilor cu vîrsta pînă la 1-3 luni - cîte $0,5 \text{ cm}^3$;
- Pisicilor mai mari de 3 luni - $1,0 \text{ cm}^3$;
- Cîinilor de la 2 luni cu masa pînă la 5 kg - $0,5 \text{ cm}^3$;
- Cîinilor mai mari de 5 kg - cîte $1,0 \text{ cm}^3$;
- Iepurilor pînă la 50 zile - $0,5 \text{ cm}^3$;
- Iepurilor mai mari de 50 de zile - $1,0 \text{ cm}^3$;
- Animalelor de blană de la 30 la 50 de zile - $0,5 \text{ cm}^3$;
- Animalelor de blană mai mari de 50 de zile - $1,0 \text{ cm}^3$.

Următoare revaccinare a animalului se va efectua anual, de două ori cu interval de 10-14 zile, în doze indicate mai sus.

Cu 10 zile în prealabil se indică dehelmintizarea animalului.

În timpul vaccinării se recomandă respectarea regulilor de aseptică și antiseptică.

Acele și seringile se sterilizează prin fierbere sau se folosesc seringi sterile de unică folosință și la fiecare animal ac aparte. Locul inoculării se prelucrează cu alcool de 70%. Înainte de administrare fiola sau flaconul cu vaccin se încălzește pînă la temperatura corpului.

11. În cazul supradozării vaccinului poate apărea hipersensibilitate individuală sub formă de tumefieri și porțiuni cu abscese. La pisici se poate observa somnolența. În cazul apariției reacției postvaccinale, animalului i se crează atmosferă liniștită iar reacția locală se tratează prin prelucrări cu tinctură de iod de 5% și remedii antiinflamatoare.

12. Imunizarea animalelor în timpul perioadei de incubare cu dermatofitoze, poate provoca apariția accelerată a simptomelor de micoze în punctele de localizare (pe pielea animalului apar focare micotice unice sau multiple). La astfel de animale peste 10-14 zile se recurge la vaccinare cu rapel în aceeași doze indicate în p. 10.

La unele animale (predominant cîini) în urma vaccinării poate apărea reacție locală.

În locul inoculării o tumefiere sensibilă. Astfel de reacție poate apărea în urma administrării vaccinului rece sau folosirea seringilor și acelor nesterile. La unele pisici după vaccinare poate apărea o somnolență ușoară care trece singură de la sine peste 2-3 zile. Animalele care au manifestat reacție se lasă în atmosferă liniștită timp de 3-5 zile.


13. De la schema de bază se recomandă de nu a face devieri, deoarece asta poate duce

la diminuarea eficienței preventive și curative în imunoterapia dermatofitozelor.

În cazul omiterii unei administrări, e important ca dozajul dat să fie injectat cît de repede posibil .

14. În cazul administrării vaccinului conform instrucțiunii, complicații și reacții adverse nu apar.

15. Se interzice administrarea vaccinului Vacderm concomitent cu preparate



imusupresore .

16. Termen de așteptare pentru produsele de origine animală nu sunt stabilite.

IV. Reguli de igienă personală

17. În timpul lucrului cu vaccinul se recomandă respectare regulilor de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu preparate de uz veterinar.
18. Medicul veterinar care efectuează vaccinarea animalului, e important să poarte haine de protecție(halat, bonetă, mănuși) și locul de lucru să fie dotat cu trusă medicală.
19. În caz de nimerire accidentală a vaccinului pe suprafața pielii sau a tunicilor mucoase , ele se spală cu apă din abundență. Dacă vaccinul se revarsă, locul dat se spală cu apă. În caz de administrare accidentală a vaccinului unei persoane , locul dat se prelucrează cu alcool etilic de 70% și e important să se adreseze în instituție medicală.
20. Unitatea – producătoare: ZAO"Vetzveroțentr", 129337, Moscova, Hibinskii pr.2
Odată cu aprobarea instrucțiunii date, cea aprobată în 26 decembrie 2006 își pierde puterea.

Importator în R. Moldova: SRL „Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4A;
Tel/fax +373022855-071; tel+373022855-073

