

Instrucțiune

pentru administrarea vaccinului Vacderm –F
contra dermatofitozelor la pisici.

I. Informații generale

1. Denumirea comercială – Vacderm-F.
Denumirea internațională nepatentată – vaccin pentru profilaxia și tratamentul dermatofitozelor la pisici – Vacderm – F.
2. Forma medicamentoasă – soluție injectabilă. Vaccinul este obținut din cultura de dermatofiți *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis* și *Microsporum gypseum*, crescuți pe medii selectate cu adaos de formalină (0,3%) în calitate de stabilizator și Ribotan (0,2%).
Se prezintă ca o suspensie de culoare roz.
Vaccinul se ambalează a câte 1,0; 2,0 și 10,0 doze (1,0; 2,0 și 10,0 cm³) în flacoane de volum corespunzător, cu dop din cauciuc și capace din metal sau fiole termosudate.
3. Flacoanele (fiolele) cu vaccin sunt ambalate în cutii. Fiecare cutie conține și instrucțiune pentru administrare.
Cutiile sunt ambalate în lăzi de carton sau alt ambalaj secundar.
Valabilitate este de 12 luni, cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare. Preparatul cu termenul expirat nu se administrează.
4. Vaccinul se păstrează și se transportă la loc uscat și întunecat, la T⁰+2+10⁰C.
5. A se păstra la loc inaccesibil pentru copii.
6. Flacoanele fără etichetă, cu termen expirat, de culoare sau consistență schimbată, cu impurități și restul vaccinului nefolosit timp de 30 minute de la deschidere se rebutează. Vaccinul Vacderm – F este inactivat și nu necesită decontaminare.
Utilizarea vaccinului nu necesită respectare anumitor precauții.

II. Particularități biologice

7. Vaccinul induce imunitate la pisici contra dermatofitozelor peste 25-30 zile, de la administrare cu rapel la interval de 10-14 zile. Se menține imunitatea timp de 12 luni.
Într-o doză de vaccin se conține nu mai puțin de 50-80 mln/cm³ de elemente micotice.
Vaccinul este inofensiv și posedă acțiune preventivă și curativă.

II. Mod de administrare

8. Vaccinul se indică pentru imunizarea cu scop preventiv și curativ a pisicilor în cazul microsporiei și trihofiției.



9. Se interzice vaccinarea animalelor cu temperatura corpului ridicată, în a doua jumătate a gestației, ca și animale cu boli parazitare sau infecțioase. Animalele bolnave mai întâi se tratează de bolile curente, apoi se vaccinează contra dermatofitozelor.
10. Vaccinul se administrează i/muscular, de două ori. Injecțiile se fac în membrele posterioare opuse, în partea interioară, la interval de 10-14 zile, în următoarele doze:
- pisici de 1-3 luni – câte 0,5 cm³;
 - mai mari de 3 luni – câte 1,0 cm³.
- Cu 10 zile în prealabil, animalul se dehelmintizează. În timpul vaccinării se respectă regulile de aseptică și antiseptică. Acele și seringile se sterilizează prin fierbere sau se folosesc seringi de unică folosință, pentru fiecare animal ac parte. Locul inoculării se prelucerează cu alcool de 70%. Înainte de administrare flaconul sau fiola cu vaccin se încălzește pînă la temperatura corpului.
11. În cazul supradozării vaccinului, la pisici poate apărea sensibilitate individuală care se manifestă prin somnolență ușoară, care trece de la sine peste 2-3 zile sau apariția unei tumefieri mici. În caz de apariție a astfel de reacție, animalul se lasă într-o atmosferă liniștită, iar la apariția reacției locale, se prelucerează cu tinctură de iod 5%.
12. Vaccinarea animalelor în perioada de incubare a dermatofitozelor, poate provoca apariția accelerată a simptomelor de micoză (pe suprafața pielii apar focare unice sau multiple). În astfel de cazuri peste 10-14 zile se recurge la administrare cu rapel în aceeași doză, cu același interval, p.10. La unele pisici după vaccinare poate apărea o reacție individuală care se manifestă ca o somnolență ușoară care trece de la sine peste 2-3 zile. Animalele ce au manifestat reacție postvaccinală se lasă în atmosferă liniștită timp de 3-5 zile.
13. Se evită devierile de la schema de bază, deoarece asta poate duce la diminuarea eficienței în cazul profilaxiei și terapiei. În caz de omitere a unei administrări se recomandă vaccinarea cît mai rapidă a acestui dozaj.
14. La administrarea conform instrucțiunii, complicații și reacții adverse nu apar.
15. Se interzice administrarea vaccinului Vacderm –F concomitent cu preparate imunosupresoare.
16. Termen de așteptare pentru produsele de origine animală în urma administrării vaccinului Vacderm –F nu sunt stabilite.

III. Regulile de igienă personală

17. În timpul lucrului cu vaccinul e important să fie respectate regulile de igienă personală și tehnica securității prevăzute în timpul lucrului cu preparate de uz veterinar.
18. Medicul veterinar ocupat în vaccinarea animalelor, e necesar să poarte haine de protecție (halat, bonetă, mănuși), iar locul de muncă să fie dotat cu



trusă medicală.

19. În caz de nimerire a vaccinului pe suprafața pielii sau a tunicilor mucoase, se recomandă să fie spălate din abundență cu apă. În caz de revărsare a vaccinului, porțiunea de podea se spală cu apă. La administrare accidentală a vaccinului unei persoane, locul inoculării se prelucrează cu alcool de 70% și e important de adresat la o instituție medicală.

20. Unitatea – producătoare: ZAO” Vetzveroțentr”, 129337, Moscova,
Hibinskii pr.2

Importator în R. Moldova: SRL „Zoofarmagro”, m. Chișinău, str.Camenița 4A
Tel/fax +373022855-071; tel +373022855-073

