



INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE ALBENDAGED-10%

suspensie orală
De uz veterinar

DENUMIREA COMERCIALĂ

ALBENDAGED-10%

DCI-ul substanțelor active

ALBENDAZOLE

COMPOZIȚIA PREPARATULUI

100 ml suspensie orală conține substanța activă:

Albendazol 10 g

DESCRIEREA PREPARATULUI

Albendaged 10% este un antihelmintic sub forma unei suspensii orale de culoare albă, cu miros inodor și gust caracteristic.

FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie orală antiparazitară

PROPRIETĂȚILE FARMACOLOGICE

Albendazol- este un antihelmintic sintetic, care aparține grupului de benzimidazol – derivați cu acțiune împotriva unei game largi de paraziți. Contra stadiilor adulte de fasciolă hepatică, activ față de nematodele gastrointestinale și pulmonare (adulte, larve, ouă), trematodele adulte și unele cestode.

Posedă acțiune ovocidă, reducând astfel contaminarea prin pășunat. Combate toți paraziții în același timp. Nu este eficient asupra trematodelor adulte. Administrat pe cale orală, se absoarbe rapid și este difuzat în toate organele și țesuturile, producând liza viermilor, indiferent de specia și categoria animalelor tratate și de localizarea paraziților. Se elimină predominant prin urină.

INDICAȚII TERAPEUTICE

La rumegatoare mici și bovine - Haemonchus, Ostertagia (incluzând și larvele ei hipobiotice), Trichostrongylus, Oesophagostomum, Cooperia, Nematodirus, Capillaria, Bunostomum, Strongyloides.

La ovine - Chabertia ovina, Marshallagia marshali și Gaigeria pachyscelis.

Nematode pulmonare in stadiu larvar si adult:

La rumegatoare mici - Dyctiocaulus, Protostrongylus spp.

Viermi lati hepatici adulti (trematode) :

La rumegatoare mici și mari - Fasciola hepatica.

La rumegatoare mici - Dicrocoelium dendriticum.

La bovine - Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Paramphistomus.

CALE ȘI MOD DE ADMINISTRARE. DOZE:

Albendaged 10 % - numai pentru administrare orală. Flaconul se agită energic înainte de folosire.

- viermi gastrointestinali, viermi pulmonari, tenii:

-Ovine, caprine: 0,5 ml / 10 kg corp;

-Ovine, caprine: 0,5 – 0,75 ml / 10kg corp (pentru viermii mari); 1 ml / 10kg corp (pentru viermii mici).

-Bovine: 5 ml / 50kg corp (pentru Fasciola hepatica); 7,5 ml / 50kg corp (pentru F. gigantica F.magna,Paramphistomum).

Cabaline : 7,5 ml/ 100 kg masa corporală.

Programul de profilaxie trebuie să cuprindă 2 administrări anual, respectiv cu 2 săptămâni înainte de ieșirea la pășunat și intrarea la stabulație.

REAȚII ADVERSE

Nu se anticipează efecte adverse după administrarea orală a dozelor recomandate. Toxicitatea acestui produs este redusă, fiind tolerate doze de 5 ori mai mari decât dozele terapeutice uzuale. Rareori în cazul supradozării pot să apară stări depresive și anorexie.

CONTRAINDICAȚII

Nu se admite administrarea preparatului animalelor gestante și celor care alăptează.



TIMP DE AȘTEPTARE

Carne și organe:

- bovine: 10 zile
- ovine, caprine: 7 zile

Lapte:

- bovine: 72 ore
- ovine, caprine: 60 ore

INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE

Dexametazona: poate crește concentrația de sulfoxid de albendazol.

Praziquantel: creștere de aproximativ 50% a concentrațiilor plasmatice la animalele sănătoase.

Cimetidina: crește concentrațiile plasmatice ale sulfoxidului de albendazol în bilă și lichidul cistic (aproximativ de două ori).

Teofilina: a fost demonstrat că administrarea dozei unice de albendazol nu inhibă metabolizarea teofilinei, albendazol induce totuși citocromul P450 1A în hepatocite .

De aceea, se recomandă monitorizarea concentrațiilor de teofilină în plasmă în timpul și după tratamentul cu albendazol.

PREZENTARE, AMBALAJ

Flacone de 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml și 1L. Ambalaj: flacoanele din materie plastică, închise etanșat, prevăzute cu capacele de plastic se plasează în cutii de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat și ferit de lumină, îngheț, la temperatura de 0 - 25°C. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

TERMEN DE VALABILITATE

2 ani.

STATUTUL LEGAL

Se eliberează fără prescripție medicală.

DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI

Septembrie, 2016.

DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI

Euro Prime Pharmaceuticals SRL,
str. Pietrarilor 8/2, mun. Chișinău,
Republica Moldova
euoprimefarmaceuticals@gmail.com
tel. +37322030016

Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj.

