

DEZI SPRAY

Soluție violet închis-uz veterinar

Compoziție:

100 ml de medicament conține ingrediente active (g):

clorhidrat de oxitettraciclină 2,5;

violet de gențiană..... 0.5.

Excipienți: polisorbat 80, glicerină, alcool izopropilic, apă distilată.

Proprietățile farmacologice:

DEZI spray este un antibiotic și chimioterapeutic utilizat în dermatologie de uz veterinar.

Mecanismul de acțiune a clorhidratului de oxitettraciclină este bacteriostatic. Sprayul are un spectru larg de activitate împotriva organismelor gram-pozitive și gram-negative: Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Bordetella, Clostridium spp, Haemophilus spp, E. coli, Pasteurella spp, Proteus spp, Klebsiella spp, Pseudomonas spp, Fusobacterium spp., Salmonella spp., Campylobacter, precum protozoare (protozoare), micoplasme (Mycoplasma spp.), Rickettsia (Rickettsia spp.) și Chlamydia (Chlamydia).

Violetul de gențiană face parte din grupul de rozanilina, cu un efect puternic antiseptic. Activitatea antimicrobiană și antifungică are față de Staphylococcus spp., Candida spp. Ea se bazează pe capacitatea de a perturba reacțiile de oxidare în celulele microorganismelor. Acțiunea astringentă a violet de gențiană se reflectă în acțiune pe schimbul de apă și sare și a țesutului în țesuturile afectate. Acest lucru duce la o scădere a hidratării, prin blocarea pătrunderii microorganismelor patogene și a produselor lor metabolice din zona de țesut mort în sănătos, restaurarea microcirculației și accelerarea regenerării zonelor afectate.

Combinația de clorhidrat de oxitettraciclină și violet de gențiană are un efect bactericid pronunțat și acțiune bacteriostatică asupra agenților patogeni.

Indicații

Tratamentul vitelor cornute mari, cabaline, porcine, ovine, caprine, păsări de curte (pui, curcani, găște, rațe), câini și pisici în bolile straturilor superficiale ale pielii și extremități.

Bovine: Tratament în răni traumatice și chirurgicale, infecții la coarne și copite, dermatite interdigitale, necrobacterioze, arsuri, ulcere, abcese, răni cu o etiologie și localizare diferită.

Cabaline: Tratament în răni traumatice și chirurgicale (inclusiv după castrare), leziuni infecțioase ale copite, panariciu, necrobacterioze, arsuri, ulcere, contuzii, abcese deschise de diferite etiologii și localizare.

Porcine: Tratamentul în plăgi traumatice și chirurgicale (inclusiv după castrare), leziuni infecțioase ale copite, epiderma exudative, leziuni la canibalism, necroza interdigitală, necrobacterioze, arsuri, contuzii, rani, eczeme, mușcături, abcese deschise de diferite etiologii și localizare.

Ovine, caprine: Tratament în răni traumatice și chirurgicale (inclusiv răni ale pielii inclusive după tundere), leziuni coarne și copite (picior putregai) infecțioase, panariciu, dermatita interdigitală, flegmon, necrobacterioze, arsuri, ulcere, abcese deschise de diferite etiologii și localizări. .

Păsări de curte (pui, curcani, găște, rațe): tratamentul ulcerelor la păsări, arsuri, plagi superficiale de diferite etiologii și localizare.

Câini, pisici: Tratamentul în plăgi traumatice și chirurgicale (inclusiv după castrare, amputarea urechilor sau cozilor), dermatită interdigitală, piodermite, eczeme, zgâriere, mușcături, contuzii, ulcere și abcese deschise de diferite etiologii și localizări.

POSOLOGIE, CALE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Aplicarea topică enternă.Înainte de a aplica pe zona afectată se îndalătură de corpuri străine, exudat,țesuturi necrotizate.

Agitați bine înainte de utilizare. Flaconul trebuie să fie păstrate în poziție verticală. Produsul este aplicat prin apăsarea spray-ului, la o distanță de 10-15 cm de la suprafața plagii. Doza depinde de dimensiunea plăgii animalului tratat.Se aplică la fiecare 12 ore până la recuperare completă a animalului.

Contraindicații

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la unul din medicamente, precum și bolile de ficat și rinichi. Sprayul nu se utilizează la vacile de lapte pentru leziunile profunde de pe uger, din cauza posibilității de penetrare a substanțelor active în lapte.

Măsuri de precauție

În cazul sacrificării forțate la animalele tratate locul prelucrat va fi îndalăturat.

Ambalare:Flacoane a câte 100 ml și 200 ml.

Păstrare:La loc uscat, întuneric, loc inaccesibil pentru copii, temperatură de 5 ° C la 25 ° C

Nu se va depozita împreună cu alimente.

Perioada de valabilitate - 2 ani.

Deținătorul autorizației de comercializare și producător: O.L.KAR-AgroVet-Servis,Ucraina

Distribuitor oficial în republica Moldova S.A. "Farmavet" ,mun. Chișinău,str.Petricani 198.