

INSTRUCȚIUNE

de administrare a preparatului Alben forte pentru dehelmintizarea animalelor agricole, inclusiv a păsărilor

I. Particularități generale

1. Denumirea comercială a preparatului: Alben forte (*Albenum forte*).
Denumirea internațională nepatentată: albendazol, oxiclozanid.
2. Forma medicamentoasă: suspensie pentru administrare orală.
Alben forte în calitate de substanță activă, în 1 ml conține albendazol – 50 mg, oxiclozanid – 37,5 mg și adjuvanți: tvin-80 – 5 mg, nipagin – 0,3 mg, lactoză – 5 mg și apă distilată – până la 1 ml.
Se prezintă preparatul ca o suspensie de culoare gri; în timpul păstrării suspensia se stratifică și se omogenizează la agitare.
3. Alben forte se produce ambalat a câte 5; 10; 20; 50; 60; 100 și 200 ml în flacoane din sticlă și polimer, a câte 500 și 1000 ml în sticle din polimer; a câte 2,5; 4 și 5 l în canistre din polimer. Flacoanele a câte 5; 10; 20; 50 și 60 ml au ambalaj secundar – cutie din carton.
4. A se păstra Alben forte în ambalaj închis al producătorului, la loc uscat, ferit de lumină, aparte de produse alimentare și furaje, la T⁰C 0+20⁰C.
Valabilitatea preparatului cu respectarea condițiilor de păstrare în ambalaj închis al producătorului – 2 ani din data producerii.
Se interzice administrarea preparatului cu termen expirat.
5. Alben forte se păstrează în locuri inaccesibile copiilor.
6. Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

II. Particularități farmacologice

7. Alben forte face parte din grupa preparatelor combinate cu spectru larg de acțiune.
Albendazolul din compoziția preparatului este activ față de formele mature și imature a nematodelor tractului gastrointestinal și a pulmonilor, contra cestodelor și trematodelor adulte. Avînd acțiune ovocidă, deminuiază infestarea pășunilor cu ouă de helminți.
Mecanismul de acțiune a albendazolului constă în dereglarea metabolismului glucidic și funcției microtubulare a helminților, ceea ce duce la moartea parazitului.
Oxiclozanidul posedă acțiune marcată trematocidă asupra tuturor stadiilor de dezvoltare a trematodelor ce parazitează la rumegătoare și

porcine, inclusiv *Fasciola spp.*, *Paramphistomum spp.*, *Dicrocoelium lanceatum* și *Echinostoma revolutum*, *Protogonimus ovatus* care parazitează la păsări.

Mecanismul de acțiune a oxiclozanidului constă în dereglarea proceselor de fosforilare la trematode, diminuarea activității fumaratreductazei și succinat dehidrogenazei, ceea ce duce la paralizia și moartea helminților.

În urma administrării per orale, oxiclozanidul și albendazolul se reabsorb rapid în tractul gastrointestinal și pătrund în organe și țesuturi; din organism se elimină în mare măsură cu urina și parțial cu fecaliile nemodificate sau sub formă de metaboliți.

Alben forte după gradul de impact asupra organismului animal face parte din substanțele puțin toxice (clasa 4 conform GOST 12.1.007-76), în dozele recomandate este ușor suportat de animale.

III. Modde administrare

7. Alben forte se indică pentru dehelmintizarea bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, găinilor, găștelor și rațelor în nematodoze, cestodoze și trematodoze.
8. Contraindicații pentru administrare poate servi sensibilitatea individuală a animalului față de componentele preparatului. Se interzice administrarea preparatului Alben forte găinilor ouătoare, din cauza acumulării preparatului în ouă, animalelor bolnave de boli infecțioase și cașexice, masculilor și femelelor în timpul monei, oilor, caprelor și scroafelor în prima jumătate a gestației, vacilor în primul trimestru.
9. Rumegătoarelor, preparatul se administrează per oral, 1 dată, individual în doză de:
 - În nematodoze a tractului gastrointestinal (hemonhoză, bunostomoză, esofagostomoză, nematodiroză, habertioză, cooperioză, strongiloidoză, trichostrongiloză, trichocefaloză, neoscarioză), nematodoze pulmonare (dictiocauloză, miulerioză, cistocauloză) și cestodoze (moniezioză, avitelinoză, tizaniezioză) în doză de 1 l/5 kg masă corp;
 - În trematodoze (fascioloză, dicrocelioză, euritremoză și paramfistomidoză), ca și în ostertagioză și protostrongiloză – 1,25 ml/5 kg masă corp.
Porcinelor în nematodoze (ascaridoză, esofagostomoză, metastrongiloză, trichocefaloză, strongiloidoză) și fascioloză, preparatul se administrează, 1 dată, individual, în doză de 1,0 ml/5 kg masă corp.
Găștelor, rațelor și găinilor în nematodoze (ganguleterachidoză, ascaridioză, heterachidoză), trematodoze (echinostomatidoză, prostogonimoză) și cestodoze

(drepanidotenioză, himenolepidoză, raietinoză), preparatul se administrează în doză de 1 ml/5 kg masă corp, două zile consecutiv, individual sau în grup (nu mai mult de 100 cap), în combifuraj dimineața. Cantitatea necesară de preparat calculată, se omogenizează în furaj, în raport de 50 gr la un cap.

Înainte de administrare suspensia se agită.

Înainte de dehelmintizare în masă, fiecare serie de preparat se testează pe un grup nu prea mare de animale (5-10 cap). În lipsa complicațiilor timp de 3 zile, se recurge la prelucrarea șeptelului întreg.

11. În caz de supradozare a preparatului , la animal se poate observa anorexie, dereglarea motorică a funcției tractului gastrointestinal, ataxie, moleșală. În așa caz, administrarea se stopează și se indică terapie simptomatică.
12. Particularități deosebite a acțiunii preparatului în caz de prima administrare sau la excluderea lui nu au fost înregistrate.
13. Se recomandă evitarea schimbărilor în schemele de dehelmintizare a păsărilor de curte pentru a nu reduce din eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei dehelmintizări, preparatul e important de administrat cât de repede posibil în același dozaj.
14. Reacții adverse și complicații în urma administrării preparatului Alben forte conform instrucțiunii nu sunt. În rare cazuri sunt posibile reacții individuale (salivație, diaree ș.a.), care trec de la sine și nu necesită terapie specială.
15. Administrarea concomitentă a preparatului Alben forte cu praziquantel, azinox și dexametazon duce la sporirea concentrației albendazolului în sângele animalului. Nu se administrează Alben forte concomitent cu preparatele fosfororganice și clororganice.
16. Sacrificarea bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcilor pentru consum uman se permite nu mai devreme decât peste 20 zile, a păsărilor – nu mai devreme decât peste 5 zile după dehelmintizare.
Laptele se permite în consum nu mai devreme decât peste 4 zile după administrare. Laptele și carcasele obținute pînă la termenul limită, se dau în hrana animalelor de blană.

IV.Reguli de igienă personală

17. În timpul lucrului cu Alben forte e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității, prevăzute în lucru cu preparate medicamentoase. În timpul lucrului se interzice fumatul, luarea mesei și a băuturilor. La sfârșitul lucrului mâinile se spală cu apă caldă și săpun.
18. Persoanelor cu hipersensibilitate la componentele preparatului e important de evitat contactul direct cu Alben forte. În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare e necesar de spălat

cu o cantitate mare de apă. În caz de apariție a reacțiilor alergice sau îngerarea accidentală a preparatului e important de adresat la instituție medicală (cu sine de avit instrucțiunea sau eticheta).

19. Ambalajele deșarte se interzice de a fi folosite în uz casnic, ele se utilizează cu deșeurile menajere.
20. Producător : OOO “ NVȚ Agrovetzascita S-P”, 141300, Rusia, reg.Moscova, or.Serghiev Posad, str.Țentralinaia 1
21. Distribuitor oficial în R.Moldova: SRL “Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4^a tel/fax +373 022 855-071; tel +373 022 855-073

Odată cu aprobarea instrucțiunii date, cea aprobată de Rosselhoznadzor în 8 aprilie 2009 își pierde puterea.