

Instrucțiune pentru utilizare

CEVAC META L



Vaccin viu liofilizat pentru imunizarea activă a puilor de găină cu
metapneumovirus

Compoziția: Vaccina CEVAC META L conține tulpina CRR126 (subtipul B) al metapneumovirusului aviar, viu liofilizat.

Indicații: Vaccina este folosită pentru imunizarea activă a puilor de găină sănătoși pentru a reduce simptomele clinice respiratorii asociate a infecției cu metapneumovirusului aviar (Sindromul Capului Umflat) și reducerea eliminării de virus în mediul ambiant.

Administrare și dozare: Vaccina poate fi administrată puilor de o zi și puilor mai în vârstă.

Vaccinarea primară trebuie efectuată ori metoda intraocular la puii în prima zi de viață ori prin metoda spray la puii de 5 săptămâni.

Pentru o imunitate mai prelungită este necesar revaccinarea puilor. Revaccinarea poate fi efectuată prin metoda spray.

Metoda administrării intraoculare

Umpleți flaconul cu liofilizat, trei sferturi cu diluantul pentru dizolvarea liofilizatului. Turnați și diluați suspensia vaccinală în diluantul rămas în flaconul de plastic cu picurător. Pentru aceste operațiuni nu se vor folosi decât seringi și ace sterile.

Sunt necesari 30 ml de diluant pentru reconstituirea a 1.000 de doze.

Țineți pasărea care va fi vaccinată cu capul aplecat într-o parte.

Țineți flaconul de plastic cu picurătorul în jos, apăsați ușor pe părți, administrând o picătură de vaccin în ochiul păsării. Asigurați-vă că vaccinul este distribuit în ochi înainte de a elibera pasărea.

Metoda administrării prin aerosoli

Pentru reconstituirea vaccinului utilizați apă distilată, sterilizată sau alternativ apă rece, curată, liberă de clor. Flacoanele cu vaccin vor fi deschise sub apă. Cantitatea de soluție vaccinală variază de la 200-500 ml / 1000 pui. Volumul poate varia în funcție de condițiile climatice. Păsările trebuie să fie ușor umede după pulverizare.

Administrați vaccinul în timpul celei mai reci perioade a zilei. Opiți încălzirea și ventilatoarele pe perioada vaccinării. Grupați păsările cât mai compact în baterii sau pe sol. Este preferabil să utilizați un pulverizator care acționează sub presiune

constantă. Folosiți duzele corespunzătoare (cele recomandate de fabricantul pulverizatorului) și reglați presiunea pentru a obține picături mari. Stingeti lumina și pulverizați păsările de la o distanță de 20-30 cm. Reveniți cu o a doua pulverizare.

Lăsați păsările liniștite timp de cel puțin 15 minute după vaccinare, după care reporniți căldura și sistemul de ventilație.



Precauții generale:

Se vor vaccina doar păsările sănătoase.

Tot timpul rotunjiți numărul de doze necesare spre o cantitate mai mare (de ex. 20 000 doze pentru 19 450 păsări).

Toți puii de găină susceptibili din același loc ar trebui să fie vaccinați în același timp.

Vaccinarea se va efectua în timpul răcoros a zilei.

Flacoanele folosite goale sau folosite parțial vor fi inactivate prin fierbere sau prelucrare cu soluție dezinfectantă.

Păstrarea și manipularea necorespunzătoare a vaccinei va scădea eficiența acesteia.

A nu se utiliza la găinile ouătoare cu 4 săptămâni înainte de debutul ouatului sau în perioada de ouat.

Efecte secundare: nu sunt cunoscute

Condițiile de păstrare: la temperatura +2+8 C, a se feri de lumină și îngheț.

Ambalaj: 500, 1000, 2000, 3000, 4000 și 5000 de doze.

Producător: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. 1107 Budapest, Szállás u.5., Hungary, tel. 003612629505.

Numai pentru uz veterinar