



## INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

**Cocciged-D**  
soluție orală  
**-De uz veterinar-**

### DENUMIREA COMERCIALĂ

**Cocciged-D**

**DCI-ul substanțelor active**

**DICLAZURIL**

### COMPOZIȚIA PREPARATULUI

**100 ml suspensie orală conține substanța activă:**

Diclazuril 10 mg

### DESCRIEREA PREPARATULUI

Cocciged-D este o soluție orală viscoasă, de culoare galbenă cu miros specific.

### FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție orală antiparazitară.

### PROPRIETĂȚILE FARMACOLOGICE

Diclazuril este un anti-coccidial din grupul benzenacetone. Diclazurilul, are o activitate potentă contra diferitelor stadii ale *Eimeria* (*Tenella*, *Acervulina*, *mitis*) întâlnite la păsări, de asemenea *Eimeria magna* și *Eimeria Stidae* întâlnite mai frecvent la iepuri, fiind eficient în prevenirea și tratamentul coccidiozei la păsări și iepuri, atât în forma cu localizare enterală, cât și cu localizare hepatică. Spectrul de acțiune este extrem de larg fiind activ împotriva tuturor coccidiilor ce parazitează la iepuri, găini, curci, găște, rațe și alte păsări. Acționează asupra tuturor stadiilor intracelulare de dezvoltare ale parazitului asupra schizontilor micro- și macrogametilor. Schizontii de prima și a doua generație indică schimbări degenerative extensive, care au ca rezultat final pierderea completă a etapei parazite.

### INDICAȚII TERAPEUTICE

Produsul Cocciged -D – soluție orală este recomandat pentru tratamentul eimeriozei la:

**Puii de gaina** – produse de coccidii din familia *Eimeridae* (*Eimeria acervulina*, *E. necatrix*, *E. mitis*, *E. tenella*, *E. brunetti*).

**Puii de curca** – produse de coccidii *E. meleagridis*, *E. adenoids*.

**Iepuri** – produse de coccidii *E. perforans*, *E. intestinalis* și *E. magna*.

### CALE ȘI MOD DE ADMINISTRARE. DOZE:

Iepuri și păsări se va administra în apa de băut:

**Profilactic:** 1 ml/ 10 litri apă pe întreaga perioadă de creștere.

**Terapeutic:** 1ml/ 5 litri sau 2ml/10 litri apă timp de 5 zile. În caz de necesitate tratamentul se prelungește încă 3-5 zile.

Apa, administrată cu preparat, trebuie să fie proaspăt preparată la fiecare 24 ore. Pe parcursul administrării preparatului este necesar ca animalele să fie asigurate în deajuns cu apă de băut, pentru obținerea unei eficiențe maxime, medicația trebuie combinată cu bune practici de gestionare (o igienă corespunzătoare, ventilație corectă, evitarea supraaglomerării).

### REAȚII ADVERSE

Nu au fost semnalate.

### CONTRAINDICAȚII

Nu se va utilizat împreună cu alte anticoccidiale. Este compatibil cu adaosuri furajere, vitamine și chimioterapice.

### TIMP DE AȘTEPTARE

Pentru carne – 5 zile.

Pentru ouă – 2 zile.

### PREZENTARE, AMBALAJ

Flacone de sticlă a câte de 10 ml, 50 ml.

Flacoane de 1 L din materie plastică, închise etanșat, prevăzute cu capacele de plastic se plasează în cutii de carton împreună cu instrucțiunea de administrare.

### PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat și ferit de lumină, îngheț, la temperatura de 0 - 25°C. A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.





**TERMEN DE VALABILITATE**

3 ani.

**STATUTUL LEGAL**

Se eliberează fără prescripție medicală.

**DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI**

Octombrie , 2016.

**DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI**

Euro Prime Pharmaceuticals SRL,  
str. Pietrarilor 8/2, mun. Chișinău,  
Republica Moldova  
[europriefarmaceuticals@gmail.com](mailto:europriefarmaceuticals@gmail.com)  
tel. +37322030016

*Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj.*

