



## INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

### COCCIGED-S

soluție orală

*-De uz veterinar-*

#### DENUMIREA COMERCIALĂ

Cocciged-S

DCI-ul substanțelor active

SULFAQUINOXALINE SODIUM

#### COMPOZIȚIA PREPARATULUI

1 ml soluție orală conține substanța activă:

Sulfaquinoxalina 200 mg

#### DESCRIEREA PREPARATULUI

Cocciged-S este o soluție orală, limpede de culoare galbenă-brună cu miros caracteristic.

#### FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție orală pentru tratamentul eimeriozelor

#### PROPRIETĂȚILE FARMACOLOGICE

Sulfaquinoxalina este o sulfamidă cu marcante proprietăți anticoccidiene (limitează activitatea acidului p-aminobenzoic din celula parazitilor) și antibacteriene (în special pentru germenii Gram-negativ).

#### INDICAȚII TERAPEUTICE

Produsul Cocciged-S – soluție orală este recomandat pentru tratamentul eimeriozei la:

**Puii de găina** – produse de coccidii din familia *Eimeridae* (*Eimeria acervulina*, *E. necatrix*, *E. mitis*, *E. tenella*, *E. brunetti*).

**Puii de curcă** – produse de coccidii *E. meleagridis*, *E. adenoids*.

**Iepuri** – produse de coccidii *E. perforans*, *E. intestinalis* și *E. magna*.

Produsul Cocciged-S – soluție orală este de asemenea eficient în tratamentul holerei și tifozei la găini și curci.

#### CALE ȘI MOD DE ADMINISTRARE. DOZE:

**Puii de găină și iepuri:** se administrează 45 ml de Cocciged-S în 22 litri apă de băut timp de 2-3 zile, după care se face o pauză de 3 zile.

Apoi se administrează timp de 2 zile câte 15 ml Cocciged-S în 11 L apă de băut, urmata de o pauză de 2 zile și de un ultim tratament cu aceeași diluție (15 ml Cocciged-S, în 1L apă de băut).

**Puii de curcă:** se administrează 15 ml Cocciged-S în 1L apă de băut în 3 serii de 2 zile consecutiv, cu 3 zile pauză.

**Găini și curci:** în holeră și tifoza: se administrează 45 ml Cocciged-S în 22 litri apă de băut timp de 3 zile.

După o pauză de 3 zile se reia tratamentul, administrându-se 15 ml Cocciged-S în 1L apă de băut, timp de 2 zile.

#### CONTRAINDICAȚII, PRECAUȚII ȘI REACȚII ADVERSE

Tratamentul se va asocia obligatoriu cu vitamina K<sub>3</sub>. Pentru evitarea intoxicațiilor nu se vor depăși concentrațiile indicate. Pe timp calduros, soluția se va administra dimineata în apa de băut, iar în restul zilei consumul de apă va fi cel obișnuit, fără medicamente. În general, produsul este bine tolerat, totuși, poate să apară sindrom hemoragic manifestat prin anorexie, epistaxis, hemoptizie, abatere, paloare a mucoaselor. Poate fi utilizat în perioada de gestație și de lactație. Nu se utilizează la găini și curci ouătoare ale caror oua sunt destinate consumului uman.

Sulfonamidele potentează acțiunea sulfanilurelor hipoglicemizante (clorpropamida, glibenclamidul, tolbutamida) prin deplasarea de pe proteine. Utilizarea concomitentă a sulfonamidelor și izoniazidei poate cauza anemie hemolitică. Acțiunea penicilinelor, care sunt active numai față de bacteriile care se multiplică, poate fi antagonizată de sulfonamide. Oxifebutazona și fenilbutazona măresc acțiunea sulfonamidelor bacteriostatice prin deplasarea de pe proteine. Probenecidul mărește nivelul plasmatic al sulfonamidelor, datorită influenței sale asupra vitezei de excreție. Metenamina nu se asociază cu sulfonamide, deoarece se scindează în formaldehidă și poate da naștere la derivați insolubili în circuitul sanguin.

La pasări supradozarea poate cauza efecte toxice, cum ar fi: anemie, întârzierea perioadei de clocire, hemoragii la nivelul musculaturii pectorale și a picioarelor.

Sulfaquinoxalina este incompatibilă cu salinomicina și narazinul.

#### TIMP DE ASTEPTARE

Carne: păsări 10 zile și pentru iepuri 28 zile de la ultima administrare.

Ouă – 5 zile de la ultima administrare.

#### PREZENTARE, AMBALAJ

Flacone de sticlă a câte de 10 ml, 50 ml.

Flacoane de 10 ml, 250 ml, 1 L și 5 L din materie plastică, închise etanșat, prevăzute cu capacele de plastic se plasează în cutii de carton împreună cu instrucțiunea de administrare.





**PĂSTRARE**

A se păstra la loc uscat și ferit de lumină, îngheț, la temperatura de 0 - 25°C. A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**TERMEN DE VALABILITATE**

3 ani.

**STATUTUL LEGAL**

Se eliberează cu prescripție medicală.

**DATA ULTIMEI VERIFICĂRI A TEXTULUI**

Octombrie , 2016.

**DENUMIREA ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI**

Euro Prime Pharmaceuticals SRL,  
str. Pietrarilor 8/2, mun. Chișinău,  
Republica Moldova  
[europimefarmaceuticals@gmail.com](mailto:europimefarmaceuticals@gmail.com)  
tel. +37322030016

*Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe ambalaj.*

