



DSM

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRAREA PRODUSULUI
COXIRIL 0.2%
(aditiv furajer)

1. Prezentare generală

Aditiv nutrițional, grup funcțional coccidiostatice.

2. Compoziție

În componența produsului intră diclazuril.

3. Formula C₁₇H₉Cl₃N₄O₂ substanța activă diclazuril pe suport de tarată și carbonat de calciu.

4. Proprietăți fizice

Vezi fișa de siguranță a produsului.

5. Ambalaj

Produsul se ambalează în saci de hârtie pluristratificați cu un strat de polietilenă.
Termenul de valabilitate 3 ani.

6. Proprietăți biologice

Produsul se utilizează pentru prevenirea coccidiozei la puii broiler la îngrasat, curcani la îngrasat, porci de guineea la îngrasat și de reproducție.

7. Modalitatea de administrare

Se administrează conform tabelului din fișa tehnică atasată. Nu există contraindicații, însă nu se recomandă administrarea simultană cu un alt coccidiostatic.

8. Măsuri de profilaxie personală

În timpul manipulării produsului este necesară respectarea indicațiilor prevăzute în fișa de siguranță a produsului emisă de producător.

Instrucțiunea este elaborată de compania DSM Nutritional Products Romania, Șoseaua de Centură, Nr. 2L, 077175 Ștefăneștii de Jos, Ilfov Tel: 021.369.57.92

SC DSM NUTRITIONAL
PRODUCTS ROMANIA SRL
J23/1070/2011 RO 28382067
Sediul: STR. LINIA DE CENTURA NR. 2,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS Județul: ILFOV

COXIRIL® 0,2 % PREMIX

Marcă înregistrată și deținută de HUVEPHARMA AD.

Introducere

Coxiril este un coccidiostatic sintetic foarte puternic care poate fi folosit strategic în programele de "clean up" (curățire) în cazul efectivelor cu presiune infecțioasă ridicată la intervale regulate.

Coxiril înlătură rezistența diferitelor tipuri de coccidii la ionofori și ajută ca eficacitatea acestora să crească în diverse programe pentru prevenirea coccidiozei.

Utilizare multiplă

Cele mai multe companii rotesc programele anticoccigiene în mod regulat în programele "shuttle" la intervale între 4 - 6 luni. Prin rotația diferitelor produse anticoccigiene se obțin îmbunătățiri în performanțele puilor de carne prin creșterea nivelului de control al coccidiozei. Tradițional, programele de rotație conțin diferite clase de coccidiostatice.

Ca programul de rotație al coccidiostaticelor să fie eficient, trebuie să se folosească clase de produse diferite din punct de vedere chimic.

Avantajele rotației coccidiostaticelor:

- rotația periodică a produselor previne folosirea lor îndelungată și dezvoltarea rezistenței la anumite produse
- toate produsele disponibile pot și ar trebui să fie folosite pentru a maximiza performanțele și a minimaliza riscul apariției rezistenței.

COXIRIL în trei tipuri de programe anticoccigiene

1. COXIRIL în furajul starter "shuttle program" (chimic/ionofor)

Presiunea infecțioasă care se poate acumula la sfârșitul perioadei de starter și care periclitează creșterea și performanțele economice ale puilor în prima perioadă, poate fi foarte eficient îndepărtată cu ajutorul COXIRIL. Prin rotația COXIRIL cu alte produse coccidiostatice va rezulta performanțe ridicate ale puilor de carne.

Durata de folosire: 6 luni

2. COXIRIL în program complet

Este recomandată folosirea COXIRIL în program complet în cazul fermelor cu presiune infecțioasă ridicată, în special după folosirea predominantă a ionoforilor.

Durata de folosire: maxim 2 serii

3. COXIRIL - fără perioadă de așteptare la puii de carne

Dozare:

Specii	Diclazuril (ppm)	Coxiril 0,2% premix (g/tonă)	Perioada de așteptare (zile)
Pui de carne	0,8-1,2	400-600	0
Curci pentru îngrasare	0,8-1,2	400-600	0
Bibilici pentru îngrasare	0,8-1,2	400-600	0

Formulă protejată sub vacum

- COXIRIL 0,2% premix este formulat sub vacum cu ajutorul unei tehnici speciale care asigură fixarea moleculei de diclazuril pe particula de suport și o distribuție omogenă a diclazurilului în premix.
- COXIRIL 0,2% premix protejat sub vacum permite un excelent amestec în premix, concentrate și în furajul final

Siguranță în folosire:

Nu sunt cunoscute incompatibilități cu alte medicamente sau alte ingrediente furajere.

Toleranță:

Coxiril nu va influența consumul de furaj sau apă, nu induce stres de căldură și nu crește umiditatea așternutului.

Marjă mare de toleranță pentru animale și oameni.

Stabilitate:

Termenul de valabilitate este de 3 ani păstrat în ambalajul original în condiții recomandate (sub 25°C ferit de umezeală și acțiunea razelor solare).

Producator :
HUVEPHARMA AD
www.Huvepharma.com

Distribuitor Romania:
SC ALTIUS SRL
Tel. 021 310 88 82/Fax 021 310 88 86
e-mail office@altius.ro

