

Diazinon 60%

Soluție insectoacaricidă de uz extern

COMPOZIȚIA:

100 ml conține:

Diazinon60g

Excipient până la..... 100 ml

DESCRIERE:

Produsul prezintă o soluție transparentă de culoare galben până la galben- maroniu.

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE:

Substanța activă, diazinonul, este un insecticid, compus organofosforic de sinteză, ce acționează prin contact și ingestie asupra paraziților externi prin blocarea acetilcolinesterazei. Diazinonul se leagă stabil de enzimă producând blocarea ireversibilă a acesteia iar mediatorul chimic acetilcolina rămânând nehidrolizată se acumulează și produce paralizia sistemului neuromuscular al parazitului.

Datorită solubilității sale, Diazinonul se absoarbe bine prin piele și se metabolizează rapid eliminându-se preponderent prin urină. Cea mai mare parte din substanța se regăsește în grăsime și în mușchi și ca reziduu minoritar în rinichi și ficat.

INDICAȚII TERAPEUTICE:

Produsul Diazinon 60% - concentrate emulsionabil de uz extern, se recomandă pentru controlul și tratamentul scabiei (sarcptică, psoroptică, corioptică, demodecică) și a ectoparazitismului produs de căpușe, păduchi malofagi și hematofagi , purici și alte insect la bovine, ovine, caprine , suine.

ANTIDOT: ATROPINA sau TOXOGONINA, administrate sub supraveghere medicală.

SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine și suine.

POSOLOGIE, CALE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Produsul se administrează numai extern, sub formă de tratamente locale, pulverizări sau îmbăieri.

Durata și frecvența aplicării tratamentului depind de natura parazitului, condițiile climatice și gradul de infestare.

Tratamentul antiparazitar se repetă la un interval de 10 – 14 zile în funcție de specia parazitului și gradul de infestare. Soluțiile se prepară și se utilizează în aceeași zi.

Bovine:

Pulverizare: 20 ml DIAZINON 60%/ /20 litri apă, diluție 1:1000, (600 ppm s.a.).
Stropirea animalului se face pe toate părțile corpului.

Tratamente locale: 5 ml DIAZINON 60%/ /1 litru apă, diluție 1:200, (3000 ppm s.a.).

Ovine – caprine:

Baia inițială :10 ml Diazinon 60% la 24 l apă,adică 1:2400 (250ppm s.a)

Completarea:25 ml Diazonon 60% la 20 l apă,adică 1:800 (750 ppm s.a)

Tratament local: 5 ml DIAZINON 60%/ / 1 litri apă, diluție 1:200 (3000 ppm s.a.).

Pulverizare: 20 ml DIAZINON 60%/ / 20 litri apă, diluție 1:1000 (600 ppm s.a.).

Este importantă menținerea concentrației soluției pentru îmbăierea în momentul când nivelul acesteia a scăzut cu 10%.Animalele trebuie imersate complet cel puțin o dată.

Suine:

Pulverizare contra scabiei: 10 ml DIAZINON 60%/ /24 litri apă, diluție 1:2400 (250 ppm s.a.).

Utilizarea la adăposturile de animale 200 ml Diazinon 60% în 5 l de apă pentru 100 m²,,care reprezintă concentrația de 1:25.

CONTRAINDICĂȚII, PRECAUȚII ȘI REACȚII ADVERSE

Nu se efectuează tratament cu DIAZINON 60% la păsări și pisici. Animalele nu se tratează cu DIAZINON 60% pe vreme umedă sau foarte caldă. Nu se aplică tratamentul cu DIAZINON 60% la tineretul bovin sub 6 săptămâni și la purceii sugari. Nu se îmbăiază oile în primele 14 zile după tundere, animalele debile și gestante, însetate sau cu plăgi provocate de tuns și nevindecate. Soluția de îmbăiere

se utilizează doar în ziua preparării după care se golește baia și se spală bine. Nu se vor adăuga la soluția de îmbăiere, sulfat de cupru sau alți agenți de umectare.

În timpul tratamentului cu DIAZINON 60% pot apărea ocazional iritații ale pielii, mâncărimi, pielea poate deveni uscată sau pot apărea crăpături ale pielii. Nu au fost

raportate efecte nedorite în urma tratamentului cu DIAZINON 60% aplicat animalelor gestante sau în lactație.

Nu se vor face simultan tratamente cu diazinon și levamisol și alți compuși organofosforici și nici în următoarele 14 zile de la aplicarea tratamentului. Nu se asociază soluțiile pe bază de diazinon cu substanțe incompatibile ca sulfatul de cupru și soluțiile acestuia, cu agenți oxidanți puternici sau cu acizi tari.

În cazul unei supradozări accidentale pot apărea iritații ale pielii, mâncărimi, stări de amețeală, toropeală. În asemenea situații se recomandă scoaterea animalului la aer curat, spălarea pielii cu multă apă și săpun, iar în cazul în care simptomele persistă trebuie cerut sfatul medicului veterinar.

PRECAUȚII SPECIALE

A se evita contactul soluției concentrate cu mucoasele!

A nu se lăsa la îndemîna copiilor și persoanelor neautorizate!

Păstrați-l departe de alimente, băuturi și furaje animale.

În timpul utilizării este interzis fumatul, băutul și mîncatul

După utilizare echipamentele se clătesc cu apă curată, mînile se spală cu apă și săpun

Produsul este toxic pentru pisici, păsări, pești și albine!

TIMP DE AȘTEPTARE

Bovine:

Carne și organe:— 14 zile

Lapte:— 3 zile

Ovine:

Carne și organe:-35 zile

Lapte:— 21 zile

Suine, caprine:

Carne și organe:— 21 zile

CONDIȚII DE PĂSTRARE

A se păstra în loc uscat, în ambalajul original, bine închis, la temperatura mai mică de 25°C, protejat de lumina directă, protejat de surse de căldură și ferit de îngheț.

MOD DE PREZENTARE

Flacoane de 10, 50 ml, 100 ml, 1000 ml.

PRODUCĂTOR: Shandong Luxi Animal Medici Share Co., LTD