

ERITROMICINĂ 10%

Soluție injectabilă – uz veterinar

COMPOZIȚIE:

Eritromicină	10g
Excipient steril până la	100 ml

ACȚIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ:

Eritromicina acționează asupra unui număr mare de bacterii Gram negative și Gram pozitive ca și împotriva spirochetelor și riketsiilor. La o oră după administrare este realizată concentrația bacteriostatică care se menține 24 de ore. Datorită gradului foarte redus de toxicitate, eritromicina poate fi administrată fără nici un risc și la scroafele gestante. Nu produce rezistență.

INDICAȚII:

În infecțiile bacteriene primare sau secundare și în toate cazurile în care se înregistrează rezistență la celelalte antibiotice.

La bovine: în afecțiunile aparatului respirator și digestiv (pleurezii, bronhopneumonii, pleurite), infecții puerperale, în omfaloflebite, preventive după retenția învelitorilor fetale. Deasemenea se indică în metrite și mastite.

La porcine: în bronhopneumonie, gripă, diareea purceilor, enterotoxemii, renite cu PPLO.

La ovine: în dezinteria mieilor nou-născuți, în infecții ale aparatului respirator, omfaloflebite și mamite.

La păsări: în micoplazmoză, coriză infecțioasă, sinovită.

La câini: în infecții primare și secundare produse de germeni sensibili.

MOD DE ADMINISTRARE:

La bovine: se administrează intramuscular 2-3 ml pentru fiecare 50 kg greutate vie. Pentru prevenirea diareei și a bronhopneumoniilor vițelilor se folosește deodată după fătare, doza se poate repeta peste 24 de ore. Pentru bovinele adulte se utilizează doza de 2 ml/50 kg greutate vie, timp de 2-3 zile, la interval de 24 de ore.

La porcine: pentru prevenirea dezinteriei infecțioase a purceilor sugari se poate administra în prima zi după naștere, intramuscular 0,25 ml/kg greutate vie, sau scroafelor gestante 1 ml/10 kg greutate vie înainte de a fâta sau imediat după fătare. La porcinele adulte, doza de 2 ml/50 kg greutate vie se administrează intramuscular la interval de 24 ore, timp de 3-4 zile.

La ovine: În dezinteria mieilor se injectează la mieii nou-născuți intramuscular 0,1 ml/kg greutate vie. Pentru ovinele adulte se utilizează doza de 2 ml/50 kg greutate vie, timp de 2-3 zile, la interval de 24 ore.

La păsări: preventive, injectarea puilor de o zi cu 0,1 ml reduce mortalitatea timpurie. Curativ se injectează intramuscular 0,2 ml/kg greutate vie, în sinuzita curcilor se injectează câte 1 ml în fiecare sinus.

La câini: 1 ml/10 kg greutate vie administrat intramuscular și repetat la 24 de ore în formele pulmonare sau enterice ale bolii lui Carre și în afecțiuni primare ale aparatului respirator sau urinar.

CONTRAINDICAȚII ȘI PRECAUȚII

Pentru animalele mari și mijlocii (inclusiv porceii), injecția se face în țesutul subcutanat din treimea mijlocie a gâtului. La locul injectării poate apărea o inflamație dureroasă care se absoarbe după 1-2 zile. Seringele vor fi bine uscate înaintea de întrebuințare.

Dacă acrescut vâscozitatea preparatului, înainte de administrare, flaconul se introduce în apă caldă la 38-40 °C timp de 15 minute.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Pentru carne – 21 zile, pentru lapte – 3 zile, ouă – 0 zile de la ultima administrare.

CONDIȚII DE PĂSTRARE:

Ferit de lumină și de umiditate, la temperatura 5-25°C, ferite de radiațiile solare directe.

PREZENTARE:

Flacoane a 10,20, 50 și 100ml

VALABILITATEA:

2 ani

PRODUCĂTOR: S.A. „Farmavet” R. Moldova.

Însoțiți orice reclamație cu numărul seriei înscrisă pe ambalaj!
--