

Nobivac Tricat Trio

Nobivac Tricat Trio , vaccin antiviral pentru pisici

1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

MSD Animal Health

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Olanda

2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Nobivac Tricat Trio, vaccin antiviral pentru pisici

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Per doză de 1 ml vaccin reconstituit:

Substanță activă:

- FCV viu, tulpina F9: minimum 4,6 log₁₀ PFU, maximum 6.4 log₁₀ PFU
- FHV-1 viu, tulpina G2620A: minimum 5.2 log₁₀ PFU, maximum 7.0 log₁₀ PFU;
- FPLV viu, tulpina MW-1: minimum 4,3 log₁₀ CCID₅₀, maximum 6.4 log₁₀ TCID₅₀ (Doza Infectantă 50% pentru Culturi Celulare)

Nobivac Diluant:

Soluție salină cu tampon fosfat

4 INDICAȚIE (INDICAȚII)

Imunizarea activă a pisicilor,

- pentru a reduce semnele clinice produse de infecția cu calicivirus felin (FCV) și herpes virus felin tip 1 (FHV-1, virusul rinotraheitei feline)
- pentru a preveni apariția semnelor clinice, leucopeniei și excreției de virus cauzate de infecția cu virusul panleucopeniei feline (FPLV).

Instalarea imunității: pentru FCV și FHV – 4 săptămâni, pentru FPLV .

Durata imunității pentru FCV- 1an, FHV, pentru FPLV – 3 ani.

5. CONTRAINDICAȚII

A nu se administra pe durata gestației sau lactației, deoarece nu s-au efectuat studii pe pisici gestante sau în lactație. Virusul FPL viu poate cauza probleme de reproducție la pisicile gestante și defecte la progeni.

6. REACȚII ADVERSE

La locul inoculării poate să apară o inflamație redusă ca dimensiuni însoțită de durere, care persistă timp de 1-2 zile. Poate să apară o creștere ușoară și tranzitorie a temperaturii corporale (până la 40°C) timp de 1-2 zile. În unele cazuri pot fi observate timp de până la 2 zile post vaccinare: strănut, tuse, scurgeri nazale, abatere ușoară și reducerea apetitului.

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect, vă rugăm informați medicul veterinar.

7. SPECII ȚINTĂ

Pisici

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Se utilizează 1 ml diluant pentru dizolvarea peletei liofilizate (= 1 doză).

Se administrează subcutanat 1 ml vaccin reconstituit.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Folosiți instrumentar steril, fără urme de dezinfectant.

Schema de vaccinare:

Vaccinarea inițială:

Două administrări a câte 1 doză, la un interval de 3-4 săptămâni.

Prima administrare se poate face de la vârsta de 8-9 săptămâni iar cea de a doua de la vârsta de 12 săptămâni. (vezi de asemenea secțiunea 12)

Revaccinare:

O singură doză (1 ml) conform următoarei scheme:

Revaccinarea împotriva calicivirusului felin, herpes virusului felin tip 1 trebuie efectuate anual .

Revaccinarea împotriva virusului panleucopeniei se efectuează la fiecare 3 ani .

10. TIMP DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Peleta liofilizată: A se păstra la frigider (2°C- 8 °C). A se proteja de lumină.

Nobivac Diluant: dacă se depozitează separat de fracția liofilizată, poate fi păstrat la o temperatură mai mică de 25°C. A nu se congela.

Valabilitate după reconstituire: 30 minute

12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Se vor vaccina doar animale sănătoase.

Anticorpii maternali care pot persista până la vârsta de 9-12 săptămâni pot influența negativ eficiența vaccinării. Vaccinarea în prezența anticorpilor maternali poate să nu prevină complet semnele clinice, leucopenia și excreția de virus consecutive infecției cu FPLV. În cazul în care se presupune existența unui nivel crescut de anticorpi maternali, programul de vaccinare va fi conceput în concordanță cu situația existentă.

Nu sunt informații privind siguranța și eficacitatea utilizării acestui vaccin concomitent cu altele. De aceea se recomandă ca nici un alt vaccin să nu fie administrat în interval de 14 zile înainte sau după vaccinarea cu acest produs.

A nu se amesteca cu nici un alt vaccin sau produs medicinal veterinar (cu excepția diluantului destinat utilizării împreună cu acest produs). A nu se administra pe durata gestației sau lactației, deoarece nu s-au efectuat studii pe pisici gestante sau în lactație.

Virusul FPL viu poate cauza probleme de reproducție la pisicile gestante și defecte la progeni.

Se recomandă ca persoanele imunodeficiente sau persoanele care iau medicamente imunosupresoare să nu manipuleze acest vaccine .

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ

Distrugerea deșeurilor prin fierbere, incinerare sau imersie într-un produs dezinfectant adecvat autorizat în conformitate cu cerințele legislative în vigoare.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

15. ALTE INFORMAȚII

Forma de prezentare: Cutii de carton a câte 5 / 10 / 25 / 50 flacoane x 1 doză vaccin însoțite de Nobivac Diluant.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

Pentru orice informații referitoare la acest produs medicinal veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului autorizației de comercializare.