

OXITOCINĂ O.L.KAR

INSTRUCȚIE

Descriere: Soluție injectabilă

Compoziție: 1 ml de medicament conține substanță activă: Oxitocina - 10 UI.

Excipienți: clorură de sodiu, apă pentru preparate injectabile.

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

ATCvet QH01 și hormoni hipofizari hipotalamusul (QH01BB02, oxitocina).

Oxitocina – este un hormon al hipotalamusului, constând dintr-un ciclu pentapeptidă și catena laterală, rezidurile celor trei aminoacizi care se acumulează în lobul posterior al hipofizei. Aceasta crește permeabilitatea de sodiu a miofibrilelor uterine, stimulând contracția acesteia. Pragul contracțiilor uterine induse de oxitocină se reduce în timpul sarcinii, cu un nivel ridicat de estrogen, sau în cazul în care animalul a intrat deja în travaliu.

Oxitocina este descompusă în tractul gastro-intestinal, de aceea trebuie administrată parenteral. După administrarea preparatului efectului se observă în 3-5 minute. Oxitocina are o activitate slab antidiuretic.

INDICAȚII

Preparatul este utilizat la animalele femele (vacă, iepe, oi, capre, scroafe, cățelele, pisici), pentru a stimula sau de a spori contracții uterine în timpul travaliului (în hipotensiune sau atonie uterină), pentru tratamentul post-partum în retenția placentei, în tratamentul complex al metritei pentru a accelera involuția uterului după travaliu, precum și pentru stimularea laptelui în agalaxie, hemoragii uterine, pentru eliberarea laptelui matern sau exsudatului inflamator în tratamentul mastitei.

MOD DE ADMINISTRARE ȘI DOZARE

Medicamentul se administrează intramuscular sau subcutanat, cu într-o singură doză de:

Vaci, iepe - 3-6 ml (30-60 UI) per animal;

Ovine, caprine - 1-1,5 ml (10-15 UI) per animal;

Scroafe - 2-3 ml (20-30 UI) per animal;

Cățelele - 0,5-1 ml (5-10 UI) per animal;

Pisică - 0,2-0,3 ml (2-3 UI) per animal.

Dacă este necesar, efect mai rapid, se permite de administra concomitant cu soluție de glucoză. În caz contrar efectul oxitocinei scade cu 30%.

Contraindicații

Hipersensibilitate la oxitocină.

Oxitocina este contraindicată la animalele în travaliu necoordonat care a apărut pe fundalul unei poziții incorecte a fătului. Oxitocina se va administra înainte de travaliu, după deschiderea completă a colului uterin, în mod obișnuit, sau se va administra mai întâi estrogeni.

Avertizare

Nu se va administra în cazul colului uterin nu este deschis sau poziționarea incorectă a fătului.

Forma de prezentare:

Fiole din sticlă de 2, 5, 10 ml; flacoane din sticlă de 10, 20, 50, 100, 200 ml, închise cu un dop din cauciuc deasupra cu aluminiu.

Depozitare

Uscat, la întuneric sau frigider, la o temperatură de 3°C până la 12°C.

Perioada de valabilitate - 2 ani.

Pentru utilizare în medicina veterinară!

Deținătorul autorizației de comercializare și producător: O.L.KAR-AgroVet-Servis, Ucraina

IMPORTATOR: SA "Farmavet", MD-2059, Republica Moldova, Chișinău, Petricani 198.

Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax: 31-72-68; www.farmavet.md