

Pestorin Mormyx

Vaccin contra bolii hemoragice și mixomatozei la iepuri

Compoziție: Substanțe active și alți ingrediente :

Compoziție – 1ml (doza):

Componenta lichidă: Calicivirus – septicemia haemoragică a iepurelui (suspensia organică) – cu titru.

Hemaglutinant de cel puțin 128 HA, hidroxid de aluminiu, thiomersal, tampon fosfat salin.

Componenta liofilizată: Poxvirus myxomatos atenuat obținut pe culturi celulare cultivate în mediul MEM, liofilizat cu titrul de cel puțin 10(33) TCID₅₀

Indicații:

Vaccinarea preventivă a iepurilor clinic sănătoși împotriva mixomatozei și bolii hemoragice a iepurilor.

Se recomandă următoarea schema de vaccinare:

Iepurii se vaccinează începând cu vârsta de 10 săptămâni.

Vaccinarea se poate începe mai devreme în efective infectate după cum urmează:

- a) Vaccinarea cu vaccin monovalent împotriva myxomatozei (Myxoren) poate fi efectuată la vârsta de 4 săptămâni și urma de revaccinare cu vaccin Pestorin Mormyx nu mai devreme de vârsta de 10 săptămâni.
- b) Vaccinarea cu vaccin Pestorin Mormyx poate fi făcută la vârsta de 6 săptămâni urmată de revaccinare după 4 săptămâni

Revaccinarea cu vaccin Pestorin Mormyx se recomandă la intervale de 6 luni în efectivele de reproducători.

Având în vedere incidența sezoniera a bolii, animalele ar trebui vaccinate (re-vaccinate) înainte de sezonul de evoluție al bolii pentru a asigura o solidă imunitate în timpul perioadei critice de infecție.

Contraindicații:

Nu se vaccinează: animalele cahectice, bolnave și femelele în ultima săptămână de gestație.

Reacții adverse

Nu au fost înregistrate

Specii țintă

Iepurele domestic

Posologie și cale de administrare

Doza este de 1 ml administrat prin injecție s.c.

Recomandări privind administrarea corectă

Agitat energic înainte de utilizare. Se diluează componenta liofilizată în lichidul component. Vaccinul astfel preparat ar trebui utilizat în decursul a doua ore.

Timp de așteptare

Iepurii nu se sacrifică timp de 7 zile datorită unor posibile reacții locale.

Precauții speciale pentru depozitare

Se pastrează la loc întunecat la +2 +8 C și nu la îndemana copiilor. Vaccinul nu se congelează.



Atenționări speciale

Nu exstă.

Precauții speciale pentru eliminarea produsului neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Vaccinul incomplet folosit și deșeurile rezultate după utilizare sunt distruse conform normelor legale.

Alte informații

Proprietăți imunologice.

Mod de acțiune:

Antigenele conținute în vaccinul administrat în organismul animal determină producerea anticorpilor specifici, ce protejează animalele imunizate atât față de mixomatoză cât și față de boală hemoragică a iepurelui.

Imunitatea se instalează complet în noua zile față de virusul mixomatos și în 10 zile față de infecția cu virusul bolii hemoragice a iepurelui; durată imunității este de un an în cazul myxomatozei.

Ambalare 1 x 1dose, 5 x 1 dose, 10 x 1 dose, 1x 5 dose, 5 x 5 dose, 10 x 5 dose, 1 x 10 dose, 5 x 10 dose, 10 x 10 dose, 1 x 20 dose, 5 x 20 dose, 10 x 20 dose

Numai pentru uz veterinar – a se elibera doar pe bază de rețetă de la medical veterinar.

