

Pestorin

(vaccin contra bolii hemoragice la iepuri)

Compoziție – Substanțe active și alți ingrediente:

Compoziție – 1 ml (dose):

Calicivirus – septicemia hemoragică a iepurelui (suspensie organică) – cu titru. Hemaglutinat de cel puțin 128 HA, hidroxid de aluminiu, saponina, soluție formaldehidă 35%, thiomersal, tampon fosfat salin.

Indicații:

Pentru vaccinarea preventivă a iepurilor sănătoși împotriva diareei hemoragice virale la iepuri.

Iepurii se vaccinează începând cu vârsta de 10 săptămâni.

Vaccinarea se poate începe mai devreme în efective infectate dar nu mai devreme de 6 săptămâni.

Revaccinarea fiind necesară după 30 de zile. Protecția completă se instalează la 10 zile după vaccinare și persistă un an.

Revaccinarea cu vaccin Pestorin se recomandă anual în efectivele de reproducători.

Contraindicații

Nu se vaccinează: animalele caectice, bolnave și femelele în ultima săptămâna de gestație.

Reacții adverse

Nu s-au înregistrat.

Specii țintă

Iepurele domestic

Posologie și cale de administrare:

1 ml subcutanat indiferent de greutatea animalului.

Recomandări privind administrarea corectă

Vaccinul se agită energic înainte de administrare.

Tipm de așteptare

Iepurii nu se sacrifică timp de 7 zile datorită unor posibile reacții locale.

Precauții speciale pentru depozitare

Se pastrează la loc întunecat, la $T^0 +2 \text{ } ^\circ\text{C}$ și inaccesibil pentru copii. Vaccinul nu se congelează.

Atenționare specială

Nu există.

Precauții speciale pentru eliminare produsul neutilizat sau a deșeurilor, după caz

Orice produs medicinal veterinar nefolosit sau deșeurile rezultate de la un asemenea produs trebuie depozitate și îndepărtate în conformitate cu prevederile legale.

Interacții cu alte produse sau vaccinuri:



Se poate combina cu alte vaccinuri care se administrează s.c. cum ar fi vaccinul contra mixamatozei (vaccin viu – conform instrucțiunii de folosire a producătorului Bioveta, a.s., Ivanovice na Hane).

Cele doua vaccinuri ne se amestica.

Incompatibilitate

Nu se cunosc.

Ambalare: 2 x 1 dose, 5 x 1 dose, 10 x 1 dose, 1 x 10 dose, 1 x 20 dose, 5 x 20 dose, 1 x 50 dose

Valabilitate : 2 ani.

Un flacon deschis se utilizează în – 10 ore.

Numai pentru uz veterinar.

