

# Dana

spot – on

*Picături insectoacaricide*

**Compoziție și acțiune farmacoterapeutică:** preparatul conține fipronil și posedă acțiune –cidă- față de larve și forma adultă a puricilor , păduchilor ,căpușelor ixode și sarcoptice care parazitează pe câini și pisici . După aplicare substanța activă(fipronil) ne absorbându-se în circulația sanguină, se acumulează în epidermă, foliculii piloși și glandele sebacee a corpului animal și oferă o acțiune îndelungată insectoacaridă . Adjuvanții sporesc pătrunderea fipronilului spre punctual localizării paraziților, deminuează procesele inflamatorii ale pielii. Acțiunea insectidă a preparatului se manifestă peste 12-24 ore și durează contra puricilor și păduchilor pe parcursul a 2 luni , protejează de atacul căpușelor ixode- până la 1 lună. Preparatul este suportat ușor de câinii și pisicile de toate rasele.

**Indicații:**Tratamentul câinilor și pisicilor în entomoze (păduchi, purici ș. a) sarcoptoze, notoendroze, otodectoze, demodecii, afecțiuni de la căpușe și protejarea de atacul ectoparaziților, la animalele de blană- în otodectoză.

**Indicații speciale:** Acțiunea acaridă a fipronilului este indusă peste 24 de ore de la aplicare, în legătură cu asta prelucrările se efectuează cu o zi înainte de plimbarea planificată în locurile posibilului atac a puricilor sau căpușelor.

**Contraindicii:** Nu se recomandă prelucrarea femelelor gestante și în lactație, motănelor și cățeilor ce nu au atins vârsta de 12 săptămâni.

**Reacții adverse:** La administrarea preparatului conform instrucțiunii, reacții adverse și complicații nu sunt. În cazul sensibilității individuale la fipronil și apariția complicațiilor (salivație abundentă, lăcrimare, vomă) ,aplicarea se stopează și preparatul se spală cu apă și săpun.

**Mod de administrare și dozaj:** Pentru tratamentul câinilor și pisicilor de entomoze și protejarea de atacul păduchilor, puricilor, căpușelor ixode- se taie vârful pipetei și dînd la o parte blana, se aplică pe piele în cîteva puncte de-a lungul coloanei vertebrale (pentru a evita lingerea) la baza capului, la gît și la grumaz în următorul dozaj:

<i>Masa animalului</i>	<i>Dozaj preparat ( ml la animal)</i>	<i>Cantitatea pipetelor necesare pentru prelucrare ( buc)</i>
Pisici 1-3 kg	0,5ml	1pipete x 0,5ml
Pisici mai mult de 3 kg	1,0ml	1pipete x 1ml
Câini < 10kg	1,5ml	1pipete x 1,5ml



10 - 20 kg	3,0ml	2pipete x 1,5ml
21-40 kg	4,5ml	3pipete x 1,5ml
mai mult de 40kg	6,0ml	4pipete x 1,5ml

Prelucrările repetate se efectuează după indicații, dar nu mai frecvent de 1 dată în lună.

***Pentru nimicirea căpușilor ixode pe corpul animalului*** preparatul se picură în cantitate de 1-2 picături pe căpușă și locul de agățare a ei pe corpul animalului. Dacă timp de 20-30 min. căpușa nu se desprinde de sinestătător, atunci ea se scoate și se distruge.

***Pentru tratamentul cîinilor, pisicilor și animalelor de blană în scabia auriculară(otodectoză)*** pavilionul urechii se curăță de cruste ,apoi se picură cite 3-5 picături în fiecare ureche și se masează baza ei.Se prelucrează numaidcît ambele urechi, chiar în cazul afectării numai a uneia.Prelucrările se efectuează 1 dată în 5-7 zile ,repetînd de 2-3 ori.

***În cazul afectării cîinilor și pisicilor de sarcoptoză, notoendroză și demodecie*** preparatul se aplică în strat subțire pe afecțiuni, uniform de la periferie spre centru , ocupînd 1 cm din pielea limitrofă, în dozaj dat în table.Pentru evitarea ingerie de preparat, animalelor li se îmbracă botnița cara se scoate peste 15-20 min. după aplicare. Prelucrare se efectuează 1 dată în zi cu interval de 7-10 zile. Cura poate fi repetată de 3-5 ori pînă la însănătoșire , care se adeverește cu două rezultate negative ale diagnosticului de laborator. Animalele cu suprafețe mari afectate se prelucrează în două etape cu interval de de 1 zi, aplicînd preparatul pe o parte a corpului , apoi pe alta.

**Indicații speciale:** Nu se recomandă scăldatul animalului 3 zile pînă la și 3 zile după prelucrarea animalului. După expirarea termenului dat, scăldatul animalului nu diminuează efectul preparatului.Pentru evitarea invaziilor repetate, așternutul animalului se schimbă sau se prelucrează cu spray insectoacaricid DANA conform instrucțiunii.

**Mod de prezentare:** Pipete din polimer a cîte 0,5ml ,1,0ml și 1,5 ml , cîte 3 și 4 în ambalaj. Ambalaj secundar – cutie din carton.

**Condiții de păstrare:** A se păstra în ambalajul producătorului, la loc uscat, inaccesibil pentru copii și animale, aparte de produse alimentare și furaje , la T +2+25<sup>0</sup>C

**Valabilitate: 2 ani**

**Producător:** OOO NPO „ Api-San” , reg.Moscova, r-l Balașihinschii, ș. Poltevscoe 4, tel+7 495 580-7713

**Distribuitor în R. Moldova:** SRL „ Zoofarmagro”, m. Chișinău, str. Camenița 4A  
Tel/fax +373 22- 855 071; tel +373 022 -855 07