

Ditrim

(antibacterian cu spectru larg de acțiune)

Compoziție și acțiune farmacoterapeutică:

Preparat antimicrobian complex cu 20% de sulfadimezină și 4% trimetoprim.

Sulfadimezina - un chimioterapic sintetic din grupa sulfamidelor.

Trimetoprim - chimioterapic sintetic din grupa diaminopirimidinei.

Combinat în proporție de 5:1 au efect sinergic și capacitate bactericidă. Sinergizmul dat se datorează în acțiunii componentelor asupra proceselor de sinteză a acidului tetrahidrofolic care stă la baza sintezei purinice a bacteriilor.

Indicații:

Preparatul dar acționează contra *E.coli*, *Clostridium spp*, *Salmonela spp*, *Proteus spp*, *Bacillus anthracis*, *Pasteurella spp*, *Haemophilus spp*, *Staphilococcus spp*, *Streptococcus spp*, *Shigella spp*, *Corynebacterium spp*, *Klebsiella spp*, *Fusobacterium spp*, *Bordetella spp* și *Coccidia* (*Eimeria* și *isospora spp*.)

V M C - bronhopneumonie, colibacterioză, paratif, metrită, coccidioză, diareie vibrioasă.

OI, CAPRE – metrită, diareie, infecțiile căilor respiratorii, pasteureloză, salmoneloză, coccidioză.

PORCI - infecțiile căilor respiratorii, metrită, dizenterie bacteriană, pasteureloză, salmoneloză, colibacterioză, sindromul MMA, coccidioză.

CABALINE - pneumonie bacteriană, septicopiemie, paratif; diareia mînjilor.

CÎINI, PISICI - infecții intestinale, pulmonare, citoizosporoză.

IEPURI - coccidioză (eimerioză)

GĂINI, RATE, CURCI – coccidioză

Mod de administrare și dozaj:

Animalelor agricole Ditrimul se administrează i/muscular 1 ml/10 kg masă vie, 1 dată în 24 ore. În cazul infecțiilor acute primele 2-3 zile se administrează doză de atac (1 ml/10 kg masă vie 1 dată în 12 ore). Tratamentul continuă pe parcursul a 2 zile după dispariția simptomelor. La iepuri și păsări este administrat în soluții buvabile proaspăt pregătite.

Profilaxie

Tratament

Iepuri

1 ml/litru apă 3 zile la rînd 1 ml/litru apă 5 zile la rînd

Găini, curci

1 ml/1 litru apă 3 zile la rînd 1ml/1 litru apă 5 zile la rînd

Rate

2 ml/ 1 litru apă 3 zile la rînd 1ml/1litru apă 5 zile la rînd

Soluția primită fiind unica sursă de apă pe tot parcursul tratamentului.

Precauții:

Nu se recomandă administrarea preparatului mai mult de 7-8 zile. Dacă doza depășește 20ml , ea se divizează în 2-3 inoculări.

Contraindicații:

Hipersensibilitate la sulfanilamide, maladii a ficatului și rinichilor. Nu se recomandă în timpul gestației, si la păsările ouătoare. Nu se combină cu preparatele acidului para-aminobenzoic, novocaină, procaină, anestezină, benzocaină, bicilină). Nu se combină într-o seringă cu alte preparate (apare sediment).

Timp de așteptare:

Sacrificarea se permite nu mai degrabă decît peste :

Păsări - 6 zile.

Iepuri---8 zile

Alte animale - 10 zile de la sfîrșitul tratamentului.

Laptele peste 3 zile (6 mulsori) în consum uman.

În hrana animalelor se folosește fără restricții.

Condiții de păstrare:

La loc ferit de lumină și umiditate.

Mod de prezentare:

Flacoane a câte 50 ml din sticlă cu soluție sterilă.

Producător:

ZAO Nita – Farm or.Saratov Rusia

Distribuitor exclusiv în R.Moldova: SRL „Zoofarmagro” m.Chișinău, str.Căminuța 4A

Tel/fax +373 022 855-071 ; tel +373 022 855-073