

CANVAC DHPPiL

Vaccin liofilizat și solvent pentru câini

Componentă (1 ml):

Ingredienți activi:

Virusul pestei canine atenuat - - EID50,

Virusul laryngotracheitei contagioase canine atenuat - - CCID 50,

Virusul enteritei parvovirotice canine atenuat - - HAU,

Virus parainfluenței canine atenuat - - CCID50,

Serotipele de Leptospire inactivate: icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, sejroe care induc un răspuns imun serologic la animale experimentale cu titru de anticorpi specifici - NLT 1:32, cu EID50 – 50% - doză infecțioasă pentru embrioni de pui și CCID 50 – 50% doza infecțioasă pentru culturi de cellule.

Solvent – apă pentru injecții 1 ml.

Indicații:

Pentru imunizarea profilactică activă a câinilor începînd cu vîrsta de 6 săptămîni contra: pestei canine, laringotraheitei infecțioase canine, enteritei parvovirotice canine, parainfluenței canine și leptospirozei cauzată de

L. icterohaemorrhagiae, *L. grippotyphosa*, *L. sejroe*. Revacinarea se efectuează peste 3 - 4 săptămîni de la prima administrare. Imunitatea se formează la 2-3 săptămîni după administrarea primară a vaccinului și persista pentru cel puțin

1 an.

Contraindicații:

Vaccinul nu se administrează animalelor bolnave, cu infecții acute, cu febră, reacții adverse post-vaccinale sau alergice la vaccinarile precedente, după stări de stres (transportări, oscelații evidente de temperatură). Nu se utilizează la animale în ultima perioadă de gestație

și imediat după fătare.

Reacții adverse

Foarte rar (1-10 animale din 10 000) administrarea vaccinului poate provoca stare sub-febrilă, inapetență tranzitorie. Aceste reacții adverse dispar în decurs de 1-5 zile. Foarte rar (1 animal din 10 000) administrarea vaccinului poate provoca reacții alergice sau reacții anafilactice. În aceste situații se recurge la un tratament simptomatic. În unele cazuri la locul de aplicare a vaccinului apare o inflamație vizibilă și sensibilă la pipăit.

Specia țintă:

Câinii.

Doza și metoda de administrare.

Doza de imunizare pentru un animal este de 1 ml, indiferent de specie, vîrstă, greutatea corporală și sex. Vaccina se va administra subcutanat, cea mai buna zona fiind cea a omoplatului. Vaccinarea primară se efectuează la vîrsta de 6-8 săptămîni.

Revaccinarea: pentru a menține imunitatea persistentă, sunt recomandate revaccinările sistematice anuale.

Recomandări cu privire la administrarea și păstrarea corectă.

Se păstrează la loc ferit de copii și de lumină, într-un loc uscat în frigider la

$t (+ 2^{\circ} + 8^{\circ}\text{C})$. Nu se permite congelarea. Nu se va utiliza după data de expirare care este indicată pe etichetă și ambalaj. Se administrează imediat după dizolvarea componentului liofilizat.

Avertizare specială

Imunitatea colostrălă începe imediat după naștere, după consumul de colostru și durează aproximativ 2-4 luni. Aceasta variază în funcție de cantitatea de colostru consumat și nivelul imunității maternale.

După imunizare, este recomandabil să se lase animalul 2 sau 3 zile în repaus. Tineretul se află în repaus pentru aproximativ 1 săptămână. În această perioadă animalele nu se supun instruirilor, sau alte activități fizice intensive.

Vaccinul poate fi administrat la un nivel timpuriu și mediu de gestație și la cățelele în lactație. Nu se permite administrarea în același timp a altor medicamente de uz veterinar, cu excepția vaccinul CANVAC R.

Produsul este numai de uz veterinar și se va administra doar cu prescripția medicului veterinar.

Pentru orice informație referitor produsului se va contacta reprezentantul local sau producătorul.

Producator:

Dyntec spol. S.r.o.

Prazska 328, 411 55 Terezin,

tel. +420 416 782 575.