

CANVAC R

Vaccin impotriva Rabiei

Indicații: Vaccinul este destinat pentru imunizarea activă a carnivorelor, biongulatelor și solipedelor.

Speciile țintă:

Animale de blană, bovine, ovine, caprine, porcine și cabaline.

Ingredienți activi: fiecare doza (1ml) conține:

Virus rabic inactivat, tulpina PV Op VB X/96 min. 2 UI

Excipienți:

Tiomersal - 0,1 mg

Hidroxid de aluminiu hidratat min. - 1,4 mg

Soluție de clorura de sodium - pînă la 1,0 ml.

Indicații:

Se recomandă pentru imunizarea activă a câinilor, pisicilor, animalelor de blană, a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor și cabalinelor împotriva rabiei. Imunitatea se instalează după 2-3 săptămâni de la administrarea vaccinului și durează cel puțin 1 an.

Contraindicații:

Vaccinarea este contraindicată în următoarele situații:

- boli infecțioase acute,
- stări patologice însoțite de febră,
- reacții adverse post-vaccinale sau stări alergice la vaccinările anterioare,
- expunere la stres (transportări, oscelații de temperatură).

Este interzisă vaccinarea animalelor bolnave de rabie sau a animalelor care au fost în contact cu/sau mușcate de animale bolnave de rabie. Animalele care au provocat mușcături oamenilor pot fi vaccinate numai după trecerea perioadei de observație.

Reacții adverse:

Vaccinul este imunologic stabil în cazul administrării unei supradoze (doze duble). Foarte rar, administrarea de vaccin poate induce o ușoară stare subfebrilă și inapetență tranzitorie. Pentru a atenua reacțiile adverse generale se recomandă tratamentul simptomatic. La locul administrării în unele cazuri poate să apară un edem local moderat care în marea majoritate a cazurilor dispare pe parcursul a două săptămâni. Dacă observați reacții adverse grave sau alte reacții care nu sunt menționate în prospect vă rugăm să anunțați medicul veterinar.

Dozaj și administrare:

Doza vaccinala pentru un animal este de 1 ml, indiferent de specie, vîrsta, sex și greutate corporală.

La caini, pisici, animalele de blana, bovine, ovine, caprine și cabaline, vaccinul se administrează pe cale subcutanat. Porcii se imunizează pe cale intramusculară.

Vaccinarea tineretului carnivorelor născuți de la mame nevaccinate poate fi efectuată începînd cu vîrsta de 1 lună, iar tineretul provenit de la mame vaccinate se recomandă de vaccinat începînd cu vîrsta de 3 luni. În cazul în care tineretul este vaccinat sub vîrsta de 3 luni se recomandă revaccinarea acestora după 4 - 6 săptămîni de la prima vaccinare.

Pentru menținerea imunității se recomandă revaccinarea sistematică anuală. La animalele adulte, o imunizare este suficientă pentru a obține imunitate suficientă. Animalele tinere fără cunoașterea provenienței pot fi vaccinate de 2 ori cu intervalul de 4 - 6 săptămîni.

Recomandări privind păstrarea și administrarea corectă:

Înăinte de a fi administrat vaccinul trebuie adus la temperatura camerei și agitat înainte de utilizare. Pregătirea dozei de imunizare, preluarea din flacon și administrarea la animal se realizează printr-o tehnică aseptica. Se păstrează la loc ferit de copii și de lumină, într-un loc uscat în frigider la $t (+2^{\circ} + 8^{\circ}\text{C})$.

Nu se permite congelarea. Nu se va utiliza după data de expirare care este

indicată pe etichetă și ambalaj. Se administrează imediat după dizolvarea

componentului liofilizat.

Produsul este numai de uz veterinar și se va administra doar cu prescripția medicului veterinar.

Pentru orice informație referitor produsului se va contacta reprezentantul local sau producătorul.

Producator:

Dyntec spol. S.r.o.

Prazska 328, 411 55 Terezin,

tel. +420 416 782 575.