

Instrucțiune (model)

Tabic M.B. – vaccin cu virus viu împotriva bursitei infecțioase

Compoziție

Substanța activă :

virus viu împotriva bursitei infecțioase, tulpina MV

- $10^{2.5}$ - $10^{3.1}$ EID₅₀/doză

Ingrediente inactice :

Bicarbonat de sodiu

- 0,385-0,458 g / comp

acid citric anhidru

- 0,268-0,320 g / comp

stearat de magneziu

- $2,05 \times 10^{-3}$ g / comp

Forma farmaceutică

Comprimat solubil .

Proprietăți imunobiologice

Vaccinul creează o imunitate împotriva bronsitei infecțioase. Imunitatea se formează în termen de 3 zile de la vaccinare .

Specia de animale

Pui .

Indicații pentru utilizare

Pentru o activă imunizarea la broiler , puii de pasăre de ouă, de reproducție și găini ouătoare împotriva bronsitei infecțioase.

Contraindicații

Nu se aplică păsărilor de curte bolnave . Este strict interzis utilizarea vaccinei dacă este deteriorată secțiunea comprimatei a blisterului, a nu reduce doza de vaccin . Nu se dizolvă în apă, cu urme de dezinfectanți și detergenți

Înainte de utilizare , citiți cu atenție instrucțiunea . Vaccinul comprimat trebuie dizolvat numai în apă rece fiartă curată . Vaccinarea se efectuează numai după dizolvarea totală a tabletelor. Soluția de vaccine trebuie utilizată în decurs de 2 ore după diluare

Interacțiunea cu alte medicamente

Informații cu privire la lipsa de nocivitate și eficacitatea vaccinului cu alte produse de uz veterinar disponibile . Decizia de a administra un produs cu alt produs veterinar aparține medicului veterinar

Instrucțiuni speciale

Nu se aplică .

Doze și mod de administrare

Vaccinul se utilizează o dată puilor la vârsta de 10 de zile, enteral sau prin metoda intraoculară

Metoda intraoculară .

Data de vaccinare se fixează în urma determinării titrelor de anticorpi materni , care ar trebui să fie 800 în IFA. În caz de diferențe semnificative la titrele de anticorpi materni , se recomandă utilizarea dublă de vaccin cu un interval de o săptămână .

Faceți clic pe blister pentru a elibera comprimatul în apă fiartă rece . Așteptați până când tableta s-a dizolvat complet pentru a elibera gazul. După dizolvarea completă în decurs de 1-2 minute, se amestecă ușor pentru a asigura dispersia omogenă a vaccinului.

Metoda enterală

Cantitatea necesară de comprimate pentru vaccinare se recomandă a fi dizolvate în 1/5 din volumul zilnic de apă consumat . Acest vaccin păsările ar trebui bea cu apa în 2-3 ore . Pentru a neutraliza clorul din apa utilizați neutralizator de clor industrial în conformitate cu instrucțiunile sau adăugând la 1 litru de apă 50 mg de lapte degresat sau 5 gr de praf de lapte degresat. După dizolvarea laptelui trebuie să așteptați 5 minute , apoi se adaugă vaccinul .

Cu câteva zile înainte de vaccinare apă potabilă trebuie să fie curățată cu oțet (concentrație de 0.5-0.8 %) sau acid citric (200-300 g/1000 l) .

Metoda intraoculară / intranazală . Comprimatele trebuie dizolvate în apă fiartă rece - 1000 de doze dizolvat în 30-50 ml de apă (cantitatea exactă de apă depinde de tipul de aplicare a perfuziei). Cu ajutorul pipetei se aplică o picătură în regiunea ochiului sau în nara. După aplicarea vaccinei capul păsării se va menține în poziție orizontală 1-2 secunde. La aplicarea vaccinei în nara, cealaltă nara se va acoperi cu degetul, ce va permite patrunderea mai adânc a vaccinei. După dizolvarea vaccinului trebuie utilizat în decurs de 2 ore.

Efecte secundare

Absent .

Perioada de retragere (carantină)

Zero zile .

Atenționări speciale pentru personal și servicii de personal care folosesc vaccinul

Angajatul trebuie să fie îmbrăcat în ochelari de protecție și mască .

Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor de vaccin neutilizate , modalități de neutralizare și reciclarea

Deșeurile de vaccinare și neutralizate să fie eliminate prin fierbere timp de 30 minute .

Termen de valabilitate

2 ani de la data fabricării. Vaccinul dizolvat trebuie utilizat în decurs de 2 ore.

Depozitare și transport

A se păstra la frigider la 2 ° C până la 8 ° C.

Ambalare

Comprimată în 500, 1000, 2000 , 2500, 5000 de doze ambalate în blistere din aluminiu . fiecare blister conținând 10 comprimate .

Condițiile de emisiune

Fără prescripție medicală .

Numele, adresa producătorului

ABIC Biological Laboratories Ltd .

P.O.B 489 , Western Industrial Zone, Beit Shemesh , 99100 , Israel