

Instructiune (model)

EDS + NDV + IB - vaccină inactivată emulsionată împotriva Sindromului Caderii Ouatului , boala Newcastle si Bronșitei infectioase

O doză (0,5 ml) conține :

Substanța activă :

O doză (0,5 ml) conține :

virusul sindromului căderii ouatului, proteine Knob - S, tulpina 127	-	$\geq 10 \mu\text{h}$
Newcastle tulpină a virusului bolii VH	-	$\geq 10^{8,4}$ EID50
virusul bronșitei infectioase , tulpina M - 41	-	$\geq 106,7$ EID50

Ingrediente inactive :

parafină lichidă	-	0.289 ml
sorbitan oleat	-	0.015 ml
polisorbat 80	-	0,005 ml

Forma farmaceutică :

Emulsie lichidă - uleioasă .

Proprietăți imunobiologice

Vaccinul generează imunitate puternică împotriva sindromul căderii ouatului , boala Newcastle și bronșitei infectioase la găini.

Specia de animale

Găini

Indicații pentru utilizare

Vaccinul se recomandă pentru imunizarea găinilor de rase ușoare și de înlocuire pentru:

- prevenirea scaderii productiei de ouă produse de virusul Bronșitei Inferctioase si reducerea infectiei la pasari
- prevenirea mortalitatii si semnelor clinice produse de virusul boalei Newcastle
- prevenirea scăderii producției de oua produsă de infecția cu virusul Sindromul Caderii Ouatului , imunitatea activate se dezvoltă în 4 săptămâni și este menținută pe parcursul perioade de ouat pînă la 18 săptămâni.

Contraindicații

Nu sunt . Nu se vor vaccina gaini bolnave .

Atenție atunci când se utilizează

Înainte de utilizare , conținutul flaconului să atingă temperatura camerei (15-25 ° C) și cu grijă se agită .

Echipment pentru vaccinare este necesar sa fie curat și sterilizat .

Interacțiunea cu alte medicamente

Necunoscută .

Instrucțiuni speciale

Nu se aplică .

Doze si mod de administrare

Înainte de utilizare , vaccinul va fi lasat să atingă temperatura camerei (15-25 ° C) și cu grijă se agită.

Vaccinul este utilizat într-o doză de 0,5 ml / cap . prin injecție intramusculară în picior sau în mușchiul pieptului sau prin injectări subcutanate. Vaccinul trebuie administrat la pasari nu mai târziu de 4 săptămâni înainte de perioada de ouat .

Perioada de retragere (carantin)

Nu se vor vaccina 21 de zile înainte de sacrificare .

Atenționări speciale pentru personal

Trebuie să se respecte regulile de lucru cu medicamente de uz veterinar .

Evitați auto-injecțarea/injecțarea accidentală poate provoca dureri puternice și inflamații, în special dacă injectarea se face în articulații sau în deget . În caz de administrare accidentală a vaccinului este necesară intervenția chirurgicală imediată în dependență de caz.

Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor neutilizate , modalități de neutralizare și reciclarea

Flacoanele produsului neutilizate vechi sau goale ar trebui să fie eliminate prin fierbere timp de 30 minute.

Termen de valabilitate

25 luni . Flaconul de vaccin deschis se utilizează în termen de 24 de ore.

Depozitare și transport

Depozitați într-un loc uscat , întunecos , la o temperatură de 2 ° C până la 8 ° C. A nu se congela !

Ambalare

Vaccinul vine în sticle de plastic de 250 ml care conține 500 de doze sau 500 ml conținând 1000 de doze .

Flaconul de vaccin este închis cu un dop de cauciuc și sigilate cu capsule de aluminiu .

Numele și adresa producătorul

ABIC Biological Laboratories Ltd .

P.O.B 489 , Western Industrial Zone, Beit Shemesh , 99100 , Israel .