

Instructiune (model)

Nectiv Forte – vaccină inactivată emulsionată împotriva bolii Newcastle

Compoziție

O doză (0,1 ml) de vaccin conține :

Virusul bolii Newcastle, tulpină a virusului bolii VH

– $10^{6,0}$ EID₅₀/doză

Ingrediente inactive :

Parafină lichidă

- 0,38 ml / doză

oleat de sorbitol

- 0,015 ml / doză

polisorbat 80

- 0,005 ml / doză

Conservant : tiomersal

- 5×10^{-5} mg / doză

Forma farmaceutică

Emulsie lăhidă – uleioasă .

Proprietăți imunobiologice

La păsările vaccinate se formează imunitate puternică peste 1 lună după vaccinare ,
care durează o perioadă de cultivare .

Specia de animale

Curceni , pui .

Indicații pentru utilizare

Pentru vaccinarea profilactică la curceni , pui de carne și ouă stoc părinte păsări de curte
pui de carne și găini ouătoare împotriva bolii Newcastle , începând cu vârsta de o zi .

Contraindicații

Hipersensibilitate la medicament . Nu se vor vaccina păsările bolnave .

Atenție atunci când se utilizează

Înainte de utilizare , se agită bine și se încălzește conținutul flaconul să ajungă la temperatura camerei
(15-20) ° C. Pentru încălzirea vaccinei nu se folosesc dispozitive de încălzire . Echipamentul de
vaccinare trebuie să fie curat și sterilizat . Nu folosiți vaccine supraîncălzite .

Interacțiunea cu alte medicamente

Necunoscut

Instrucțiuni speciale

Nu este cazul .

Doze si mod de administrare

Înainte de utilizare , se agită bine și se încălzește conținutul flaconul să ajungă la temperatura camerei (15-20) ° C.

Vaccinul este injectat în pui de o zi prin injectare subcutanată sau intramusculară , în doză de 0,1 ml , în combinație cu vaccin viu împotriva bolii Newcastle , care este folosit intraocular, intranazal sau metoda de pulverizare .

Efecte secundare

Nu s-au confirmat .

Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor neutilizate , modalități de neutralizare și reciclarea

Flacoanele produsului neutilizate vechi sau goale ar trebui să fie eliminate prin fierbere timp de 30 minute.

Termen de valabilitate

27 luni . Flaconul de vaccin deschis se utilizează în termen de 2-3 de ore.

Depozitare și transport

Depozitat într-un loc uscat , întunecos , la o temperatură de 2 ° C până la 8 ° C. A nu se congela !

Ambalare

Vaccinul vine în sticle de plastic cu capacitatea de 250 ml , care conține 500 de doze sau 500 ml conținând 1000 de doze . Flacon de vaccine este închis cu un dop de cauciuc și sigilat cu capsule de aluminiu .

Numele și adresa producătorul

ABIC Biological Laboratories Ltd .

P.O.B 489 , Western Industrial Zone, Beit Shemesh , 99100 , Israel .