

## Instructiune (model)

### Salmin Plus – vaccin inactivat emulsionat împotriva salmonellei.

#### Compoziție

O doză ( 0,3 ml ) de vaccin conține :

Substanța activă :

Salmonella enteritidis , tulpina RT B3	- $3,3 \times 10^7$ CUO
Salmonella enteritidis , tulpina PT C8	- $3,3 \times 10^6$ CUO
Salmonella typhimurium , tulpina PT 2 ( 4 + )	- $3,3 \times 10^7$ CUO
Salmonella infantis , tulpina 122798	- $3,3 \times 10^7$ CUO

#### Ingrediente inactive :

octodețenoat efir anhidromanitol - 0,18 g

#### Forma farmaceutică

Emulsie lichidă - uleioasă .

#### Proprietăți imunobiologice

Vaccinul generează imunitatea activă împotriva Salmonella enteritidis , Salmonella typhimurium , Salmonella infantis . Imunitate puternică formată peste trei săptămâni după revaccinare și continuă pe tot parcursul perioada de productivitate.

#### Specia de animale

Gaini

#### Indicații pentru utilizare

Pentru imunizarea activă a găinilor ouătoare , pui de carne stoc părinte de păsări de curte si ouă împotriva salmonella cauzate de S. enteritidis , S. typhimurium , S. infantis .

#### Contraindicații

Hipersensibilitate la medicament . Nu se vor vaccina gaini bolnave si puii de gaina cu virsta sub 3 saptamani.

#### Atenție atunci când se utilizează

Înainte de utilizare , conținutul flaconului se lasa să se încălzească la  $37^{\circ}\text{C}$  și se agită bine .  
Echipament pentru vaccinare este necesar să fie curat si sterilizat. Pentru vaccinare utilizati 16-18 g  $\frac{1}{4}$  " ac  
Când utilizați seringă automată , acul trebuie schimba la fiecare 800 de injecții .

#### Instrucțiuni speciale

Nu se aplică .

#### Doze si mod de administrare

Vaccinul este folosit la vârsta de 5 săptămâni la o doză de 0,3 ml / cap . intramuscular în mușchii sternului .  
Revaccinarea se efectuează în 4-6 săptămâni , dar nu mai târziu de 4 săptămâni înainte de începerea perioadei de ouat .

#### Efecte secundare

În locul vaccinarii sunt posibile reacții locale, cum ar fi umflarea de 5-10 mm , care dispar de la sine in 2-3 saptamani .



### **Perioada de retragere ( carantin )**

Nu se vor vaccina cu 21 de zile înainte de sacrificare .

*Atenționări speciale pentru personal și servicii de personal care administrează vaccinul*

Evitati auto-injectarea/ ingestie accidentală , varsarea intimplator pe piele. In caz de administrarea accidentală este necesara adresarea la medic și prezentarea acestui prospect sau eticheta .

- Pentru personalul :

Acest produs imunobiologic veterinar conține ulei mineral .

Auto-injectarea poate provoca dureri puternice și inflamații , în special daca injectarea se face in articulatii sau deget , în cazul în care nu la timp ati obținut asistență medicală de urgență este posibilă amputarea degetului deteriorat . Ajutorul medicului ar trebui să se aplice imediat si arătați acest prospect , fila , chiar dacă ați pus o cantitate mică de lichid

### **Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor neutilizate , modalități de neutralizare și reciclarea**

Flacoanele produsului neutilizate vechi sau goale ar trebui să fie eliminate prin fierbere timp de 30 minute .

### **Termen de valabilitate**

2 ani . Flaconul de vaccin deschis se utilizeaza in termen de 10 ore .

### **Depozitare și transport**

Depozitați într-un loc uscat , întunecos , la o temperatură de 2 ° C până la 8 ° C. A nu se congela !

### **Ambalare**

Sticle de plastic de capacitate de 300 ml , conținând 1000 de doze sau 500 ml conținând 1666 de doze .

Flacon de vaccine este închis cu un dop de cauciuc și sigilate cu capace din aluminiu .

Pungi de poliolefină , cu o capacitate de 300 ml , conținând 1000 de doze , 500 ml conținând 1666 de doze ,

600 ml conținând 2000 de doze , 1000 ml , care conține 3333 sau 2000 ml doze conținând 6666 de doze .

Sticlele și pungile de vaccin plasate în cutii de carton . Fiecare pachet este etichetat

### **Numele și adresa titularului certificatului de înregistrare și producătorul**

ABIK Biolodzhkyal Laboratories Limited . , A / C 489 , Western Industrial Zoun , Beit Shemesh , 99100 , Israel .