

## Oftalmo-gel

### Compoziție:

Masă semifluidă, de culoare galbenă.

1gr. Conține (mg)

Ivermectină - 0.25

Tilozină tartrat - 10.0

Xeroform - 10.0

### Ațțiune farmacoterapeutică:

Oftalmo-gel - complex compus din xeroform (antiseptic), ivermectină și tilozină – tartrat (antibiotice din grupa macrolidelor).

Ivermectină - acționează asupra sistemului nervos a nematodelor și antropodelor parazite provocând paralizia și moartea acestora prin stimularea producerii acidului

gamaaminobutiric(GABA) la nivelul sinapselor , ceea ce blochează transmiterea influxului nervos. Acționează asupra nematodelor (*Thelaziidae*), formele mature și larvale, căpușilor acariforme (*Demodecidae*, *Psoroptidae*, *Sarcoptidae*) și insecte zburătoare (*Muscidae*)

Tilozină tartrat - are acțiune antibacteriană bine pronunțată față de unii germeni microbieni precum și asupra asociațiilor microbiene cum ar fi (*Mycoplasmatoceae*, *Richettsiaceae*, *Streptococcus spp*, *Staphylococcus spp*) la fel și asupra altor microorganisme patogene.

Xeroform - are acțiune antiseptică asupra infecțiilor secundare , acționează antiinflamator, siccativ și repellent.

Componentele Oftalmo-gelului acționează sinergic, asigura produsului un spectru mai mare de acțiune (bactericidă, antiinflamatoare, nematocidă, acaricidă, insecticidă și repelentă)

### Indicații:

1. Tratamentul bolilor oftalmice de etiologie parazitară la WMC, câini, iepuri. Bovine- (*Thelaziidae*)

Blefarite, cheratite (superficiale), conjunctivite (acute, catarale, purulente, foliculare), cheratoconjunctivite infecțioase (richettioză) sau de etiologie parazitar-infecțioasă.

2. Otite de etiologie parazitară (câini și iepuri) - pavilionul urechii, canalul auditiv, urechea medie.

Notoedroza, otodectoza, sarcoptoza, chorioptoza, heiletioza, psoroptoza.

3. Tratamentul miazelor la bovine, câini, pisici.

### Mod de administrare și dozaj:

1. *Thelaziidae* (bovine) - după fixarea capului, cu ajutorul seringii-dozator în sacul conjunctival se administrează 0.8-1ml Oftalmo-gel după ce se masează ușor. Se administrează pe parcurs a 3-4 zile cu interval de 24 ore.

Pleoapele inflamate se curăță de cruste și cu ajutorul unui tampon se aplică Oftalmo-gel . În cazul altor boli oftalmice pe unghiul intern a ochului se aplică câte 5 -7 picături, 4-7 ori de tot cu interval de 12 ore. Dacă blefarita este provocată de paraziți, cura de tratament se repetă la fiecare 10 zile, 2-3 ori de tot, indiferent de rezultatele primei cure.

2. În cazul otitelor se înlătură părul , crustele și cu ajutorul unui tampon se prelucrează țesuturile afectate de 2 ori pe zi pe parcurs a 3-4 zile. Se prelucrează ambele urechi. Dacă boala este de etiologie parazitară, la 8-10 zile prelucrarea se repetă

3. În profilaxia volfartiozei, plăgile afectate la timp de vară se prelucrează cu Oftalmo-gel. Rănile infestate cu larvele muștelor se prelucrează de 2 ori pe zi , timp de 3-4 zile.

### Contraindicații:

Hipersensibilitate individuală.

### Mod de prezentare:

Seringă-dozator din polimer a câte 4, 10 și 20 ml.

### Condiții de păstrare:

La loc uscat ,ferit de lumină, la T`+10+20`C

Valabilitate:





**2 ani**

**După deschidere -2 ani cu condiia ermetizarii ambalajului.**

**N- de inregistrare 1852-02-666-06 de la 31.05.2006**

**Producător: Ucraina Brovafarma**

**Distribuitor oficial în Republica Moldova**

**SRL "ZOOFARMAGRO "**

**Tel: +373 22 355-240**

**fax: +373 22 855-071**

