

OXITETRACICLINĂ 10% sol. inj.	MED-DO 011/2013
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	18/98

OXITETRACICLINĂ 10%

Soluție injectabilă

Antimicrobian cu spectru larg

Uz veterinar

Compoziție.

Oxitetracilină clorhidrat	– 10,0 g
Procaină clorhidrat	- 1,0 g
Solvent pînă la	– 100 ml

Acțiune farmacoterapeutică.

Oxitetraciclina are efect cid atât asupra bacteriilor Gram negative (*Aeromonas spp.*, *Bordetella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Salmonella spp.*, *Sighella spp.*, *Yersinia spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*) și Gram pozitive (*Actinomyces spp.*, *Bacillus spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria spp.*), *Rickettsia spp.*, *Spirocheta spp.* și *Mycoplasma spp.*, cât și asupra virusurilor mari. Se absoarbe repede, atingând într-o oră concentrația serică activă.

Indicații.

Oxitetraciclina se recomandă în prevenirea și combaterea următoarelor afecțiuni, astfel:

- la bovine în pneumonii infecții postpartum, febra de transport, difteria vițelor, în alte infecții primare sau secundare produse de germeni sensibili la oxitetraciclina;
- la porcine, în pneumonii, infecții salmonelice, complicații microbiene secundare etc.



OXITETRACICLINĂ 10% sol. inj.	MED-DO 011/2013
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	19/98

Mod de administrare si doze.

La bovine, porcine medicamentul se injectează intramuscular în doză de 5-10 ml/100 kg greutate vie/zi. Tratamentul se repetă la 48 de ore.

ATENȚIE !!! În prealabil se va încălzi soluția pînă la 30 - 35°C, pentru a facilita administrarea.

Contraindicații și precauții.

La stabilirea dozei pentru un animal se va ține seama de starea generală a acestuia. Inocularea intramusculară se va efectua în straturile profunde.

Dacă se administrează o cantitate mai mare de soluție, se va prefera divizarea dozei și inocularea în mai multe puncte.

Tetraciclina este potențial nefrotoxică și este contraindicată în cazul afecțiunilor renale sau împreună cu alți agenți nefrotoxici.

Nu este permisă utilizarea la animale în lactație care produc lapte pentru consum uman.


Timp de așteptare.

La animalele destinate sacrificării pentru carne 15 zile (bovine), 10 zile (suine).

Pentru producția de lapte destinat consumului uman 3 zile.

Condiții de păstrare. La temperatura 18 - 20°C, ferit de lumina.

Termen de valabilitate. 2 ani



S.A. „Medicamentum”
Republica Moldova

OXITETRACICLINĂ 10% sol. inj.	MED-DO 011/2013
Ediția	1
Revizia	00
Pagina	20/98

Mod de prezentare. Flacoane 50 ml produs ambalate în cutii de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

Producător. SA „Medicamentum”, rn. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel/ fax 0-265-62-246, e-mail:medicamentum@mail.ru.

