

Oxitetraciclină 10%
Soluție injectabilă uz veterinar

COMPOZITIE:

Oxitetraciclină – HCl	10 g
Solvenți pînă la	100 ml

ACȚIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ

Oxitetraciclina posedă acțiune bacteriostatică, în primul rînd, asupra mycoplazmelor, chlamidiilor, richetsiilor, spirochetelor și coccidiilor. De asemenea, este activă contra altor bacterii Gram – pozitive (Staphilococcus, Streptococcus, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., Clostridium perfringes și Cl. Tetani, Listeria monocytogenes și Nocardia) și a multor bacterii Gram – negative (Bordetella sp., Bartonella, Haemophilus sp., Pasteurella multocida, Shigella, Jersinia pestis și altele). Modul de acțiune constă în inhibiția sintezei de proteine la nivelul ribosomilor celulei bacteriene și modificarea permeabilității membranei citoplasmatică. Efectul bactericid poate fi realizat prin creșterea concentrației de antibiotic, însă, în astfel de cazuri, se inhibă și sinteza de proteine din celula mamiferilor.

INDICAȚII:

Se recomandă în prevenirea și combaterea următoarelor boli:

- *Păsări* : în boala respiratorie cronică, sinuzita infecțioasă și în alte infecții cu germeni sensibili la oxitetraciclină;
- *Bovine* : în pneumonii, infecții post – partum, febră de transport, difteria vițelilor, infecții primare sau secundare produse de germeni sensibili;
- *Oi și miei* : în pneumonii, febra de transport, omfaloflebita mieilor etc.;
- *Porcine* : în pneumonii, infecții salmonelice, complicații microbiene secundare etc.

MOD DE ADMINISTRARE:

La mamiferele mijlocii și mari – se inoculează intramuscular în doză de 5-10 ml/100 kg greutate vie. Tratatamentul se repetă la 48 ore.

La animale mici – se inoculează subcutanat în doza de 1-2 ml/10 kg greutate vie.

La păsări – se inoculează subcutanat, dozele zilnice fiind în funcție de vîrstă:

- Pui de 1-14 zile - 0,5 ml din soluția diluată 1:3 în apă distilată sterilizată;
- Pui de 2-4 săptămâni - 1 ml din soluția diluată 1:3 apă distilată sterilizată;
- Pui de 4-8 săptămâni - 1 ml din soluția nediluată;
- La tineretul aviar de 8-12 săptămâni - 1 ml soluție nediluată;
- Păsări adulte - 2 ml soluție nediluată.

CONTRAINDICAȚII ȘI PRECAUȚII:

La stabilirea dozei pentru un animal se va ține seama de starea generală a acestuia. Inocularea intramusculară se va efectua în straturile profunde. Dacă se administrează o cantitate mai mare de soluție, se va prefera divizarea dozei și inocularea în mai multe puncte.

Uneori, după inoculare, pot apărea dureri ușor amendabile prin masarea locului.

AȚIUNI ADVERSE:

Oxitetraciclina, fiind administrată animalelor tinere, colorează oasele și dinții în galben, gri sau în culoare cenușie. Dozele mari pot întârzia creșterea oaselor și dinților.

Administrarea intravenoasă rapidă poate provoca hemoliză intravasculară, însoțită de hemoglobinurie. Soluțiile care conțin propilenglicol administrate vițelilor, pot avea efect cardiodepresant. Administrarea intramusculară este însoțită de reacție pasageră locală manifestată prin colorarea galbenă și uneori, necroză. La animalele mici (câini, pisici) provoacă vomituri, vomă, anorexie și diaree. La cabaline, în special la mânji, poate provoca dereglări gastrointestinale grave cu consecințe imprevizibile.

TIMP DE AȘTEPTARE:

Pentru animale de măcelărie - 10 zile;

Pentru animale în lactație - 4 zile;

Pentru găini - 10 zile de la ultima administrare.

CONDIȚII DE PĂSTRARE:

Ferit de lumină și de umiditate la temperatura 15-25°C.

PREZENTARE:

Flacoane a 10, 20, 50, 100 ml.

VALABILITATEA:

2 ani

PRODUCĂTOR:

S.A. „Farmavet” R. Moldova.

Însoțiți orice reclamație cu numărul seriei înscrisă pe ambalaj!
--