

Prospect
Shandong Soocom Animal Remedy Co., Ltd.
DICOXOL-5 WS
(Pulbere hidrosolubilă orală Diclazuril 0,5%)


Compoziție:

Diclazuril – 0.5%

Exc. – Glucoză medicinală, conform standartelor CPV 2005.

Formula moleculară

$C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$



Descrierea preparatului și farmacologie:

Diclazurilul face parte din grupa chimică phentriazine-acetonitrile. E o substanță de ultimă generație cu un spectru larg de acțiune asupra eimeriilor, la moment fiind una din cele mai bune în combaterea și tratarea coccidiozelor la păsări, iepuri și alte animale. Are un efect rapid și sporit asupra eimerilor în toate stadiile de evoluție a acestora.

Este un preparat sigur în utilizare, nu sunt cunoscute efecte adverse, nu produce toxicitate și nu are efect rezidual.

Datorită costului mic, este convinabil și din punct de vedere economic, poate fi folosit atât în furaj cât și în apa de băut.



Doza de administrare foarte mica (1ppm), timp de așteptare foarte scurt.

Poate fi folosit în prevenirea și tratarea următoarelor eimerioze: La iepuri (*Eimeria magna*, *E.nagpurensis*, *E.perforans*, *E.piriformis*, *E.stiedae*, *E.media* .), la Păsări (*Eimeria acervulina*, *E.adenoeides*, *E.brunette*, *E.dispersa*, *E. duodenalis*, *E.maxima*, *E.mitis*, *E.necatrix*, *E.tenella*.), la miei (*Eimeria crandallis*, *E.ovinoidalis*, *E.veybridgensis*,) de asemenea și în cazul eimeriozelor altor specii de animale.

Dozare și administrare:

Se administrează oral cu apa de băut sau furajele.

Pentru pasări, iepuri, porci și miei 1g/1-2L apă, sau 1g/1-2kg furaj, timp de 2-5 zile.

Cu scop preventiv se propun cure a câte 7- 10 zile în doze de 1g/5L apă sau 1g/5kg furaj.

Containdicații:

Nu se va administra pasărilor ouăle cărora sunt destinate consumului uman. Nu se administrează curcilor de prasilă.

Timp de așteptare : sacrificarea animalelor și păsărilor se permite de la 7-a zi după administrarea preparatului.

Ambalaj : 50g, 100g, 500g, 1kg.

Producator: Shandong Soocom Animal Remedy Co., Ltd.

