

Instrucțiune  
la administrarea preparatului **Eimitem 2,5 %**  
în tratamentul și profilaxia coccidiozei la păsări

**Compoziție și acțiune farmacoterapeutică:** Eimitem 2,5% preparat anticoccidian din grupa triazintrionei care într-un ml conține **25 mg** de toltrazuril.

Toltrazurilul din compoziția preparatului posedă acțiune anticoccidiană față de toate stadiile de dezvoltare intracelulară (mezozoizi și schizogonizi) a coccidiilor (eimeriilor) care parazitează la păsări inclusiv *Eimeria acervulina*, *Eimeria bruneti*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria mitis*, *Eimeria adenoides*, *Eimeria meeagrimitis*, *Eimeria anceris*, *Eimeria truncata* și alte coccidii rezistente la substanțe anticoccidiene.

Toltrazurilul blochează fermentii respiratori și acționează distructiv asupra mitocondriilor și proceselor de multiplicare, dereglând procesul de formare a macrogameților și duce la moartea parazitului.

În urma administrării per orale a preparatului, toltrazurilul din compoziție se absoarbe lent și acționează anticoccidian pe tunică mucoasă și submucoasă a tractului gastro-intestinal. Se elimină toltrazurilul din organismul păsării nemodificat sau sub formă de metaboliți cu dejecțiile.

**Indicații:** Preparatul Eimitem 2,5% este indicat puilor de carne, tineretului aviar, curcilor, găștilor și rațelor cu scop preventiv și curativ la apariția primelor simptome a bolii.

**Contraindicații:** Nu se administrează găinilor ouătoare din motivul acumulării în ouă. Se interzice administrarea după expirarea termenului de valabilitate.

**Indicații speciale:** Pe toată durata tratamentului pasărea trebuie să consume numai apă cu preparatul dat. Soluția curativă își păstrează calitățile timp de 48 ore. În cazul apariției sedimentului, soluția se agită bine până la omogenizare. Preparatul Eimitem 2,5% este compatibil cu vitaminele, adaosurile furajere și toate preparatele folosite în avicultură.

**Precauții:** În cazul supradozării se manifestă inapetență, diminuarea consumului de apă și pierderea din greutate. Preparatul nefolosit se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare.

**Mod de administrare și dozaj:** Preparatul Eimitem 2,5% se administrează păsărilor în apă de băut, două zile consecutiv în doză de 7 mg de toltrazuril /1 kg masă corp ( 28 ml preparat la 100 kg masă corp.) ceea ce este echivalent cu

- 1 ml/ 1 l apă de băut care se administrează timp de 48 ore



Exemplu  $X = M * 7\text{mg}$

-----  
25 mg

Unde : M – masa totală a păsărilor

7 mg – doza per kg masă corp

25 mg – cantitate de SA într-un ml de preparat și

X – volumul de preparat necesar pentru șeptelul dat

Volumul de apă se ia în raport de anotimp și metoda de întreținere, astfel ca dozajul diurn să fie consumat într-o zi.

**Reacții adverse:** La administrarea preparatului conform instrucțiunii , reacții adverse și complicații nu se manifestă.

**Timp de așteptare:** Sacrificarea puilor de carne pentru consum uman se permite peste 14 zile , a curcilor, găștelor și rațelor nu mai devreme de 16 zile de la ultima administrare. În cazul nerespectării termenului limită carcasele se dau în hrana animalelor de blană.

**Mod de prezentare:** Preparatul Eimitem 2,5% se prezintă ca o soluție transparentă de culoare de la galbenă până la brună ( se permite opalescență) în flacone de polietilenă și plastic polimer, canistre din polietilenă cu capac swift off și sigil. Fiecare flacon se ambalează în cutie de carton.

**Condiții de păstrare:** A se păstra în ambalaj original închis, la loc ferit de lumină și umiditate, aparte de produse alimentare și furaje la  $T+5+25^{\circ}\text{C}$ . La loc inaccesibil penru copii.

**Valabilitate:** 2 ani.

**Producător:** NVТ „Agrovetzașcita” Rusia .or. Moscova 126329, str. Kolskaia 1

**Distribuitor exclusiv în R. Moldova:** SRL „ Zoofarmagro” Moldova,m.Chișinău,  
str.Camenita 4A tel/fax +373 022 855-071  
Tel +373 022 855-073