

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

OXITETRACICLINA 20%, pulbere pentru suine, mânji, viței, miei, iezi, iepuri, nurci, câini, pisici, păsări (pui broiler, găini, curci, rațe, găște) și pești.

2. COMPOZITIA CALITATIVA ȘI CANTITATIVA

100 grame de pulbere conțin:

Oxitetraciclină clorhidrat 20 g

Excipienți, q.s.ad.....100 g

Pentru lista completă a excipienților, vezi secțiunea 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ:

Pulbere pentru administrare în furaj sau în apa de băut.

Se prezintă sub formă de pulbere amorfă, de culoare galben – deschis, până la galben.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE:

4.1 SPECII ȚINTĂ:

Suine

Mânji

Viței

Miei

Iezi

Iepuri

Nurci

Câini

Pisici

Păsări (pui broiler, găini, curci, rațe, găște)

Pești.

4.2 INDICAȚII DE UTILIZARE:

Produsul este recomandat în prevenirea (în efectivele în care diagnosticul a fost confirmat) și tratamentul afecțiunilor produse de germeni sensibili la oxitetraciclină la suine, mânji, viței, miei, iezi, iepuri, nurci, câini, pisici, păsări (pui broileri, găini, curci, rațe, găște) și pești:

Suine: pneumonia enzootică, enterite bacteriene, artrite și rujet

Mânji, miei, iezi: enterite bacteriene, infecții respiratorii, omfalite, artrite



Viței: infecții secundare asociate cu pneumonia virotică, enterite bacteriene, artrite, difteria vițelilor, omfalite.

Iepuri și nurci : enterite de natură bacteriană.

Câini : infecții secundare asociate cu hepatita.

Pisici: anemia infecțioasă felină și infecțiile secundare asociate cu panleucopenia felină și influența felină.

Păsări(pui broileri, găini, curci, rațe, găște) : holera aviară, tifoza aviară, coriza infecțioasă, sinuzita infecțioasă, sinovita infecțioasă, diaree nespecifică, micoplasmoză, artrita stafilococică, pseudotuberculoza, septicemie coliformă și infecțiile secundare asociate cu bronșita infecțioasă, boli respiratorii cronice, laringotraheita infecțioasă, variola aviară.

Pești: eritrodermatita, infecții ale vezicii înotătoare la crap și furunculoza la păstrăv.

4.3 CONTRAINDICAȚII:

Nu se administrează per os la bovinele și cabalinele adulte.

Nu se administrează cu 3 zile înainte și după vaccinări cu vaccinuri bacteriene vii.

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau la excipienți.

4.4 ATENȚIONĂRI SPECIALE PENTRU FIECARE SPECIE ȚINTĂ

A se evita administrarea la animale cu ulcer gastric și colită ulceroasă.

Administrarea la rumegătoare a produsului poate produce o modificare a florei gastro-intestinale. Aceste fenomene au caracter tranzitoriu și reversibil.

Pe toată durata tratamentului animalele trebuie să bea numai apă medicamentată și să consume numai furaj medicamentat.

4.5. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE:

- **Precauții speciale pentru utilizare la animale**

Este recomandat ca tratamentul să se inițieze după efectuarea antibiogramei. Dacă acest lucru nu este posibil, tratamentul trebuie să se efectueze pe baza informațiilor epidemiologice locale. Trebuie luate în considerare politicile antimicrobiene naționale și regionale, atunci când se utilizează produsul.

Apa medicamentată trebuie consumată în totalitate, în ziua preparării.

Produsul nu trebuie administrat ca atare.

La tratamentul în masă, prin furaje sau apa de băut, se recomandă prepararea de preamestecuri, pentru o omogenizare corespunzătoare.



- Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la oxitetraciclină sau la excipientul produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

A se evita contactul cu ochii și pielea. În cazul contactului accidental cu pielea sau ochii, clătiți cu multă apă, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați medicului prospectul produsului sau eticheta.

4.6. REACȚII ADVERSE:

În cursul procesului de osteogeneză tetraciclinoale pot determina colorarea în galben a dinților, pigmentații dentare, carii.

4.7. UTILIZAREA ÎN CAZUL PERIOADEI DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT:

Nu există restricții.

4.8. INTERACȚIUNI CU ALTE PRODUSE MEDICINALE SAU ALTE FORME DE INTERACȚIUNE:

Se va evita administrarea concomitentă cu pēnicilinoale și cefalosporinoale.

4.9. CANTITATI DE ADMINISTRAT ȘI CALEA DE ADMINISTRARE:

Produsul se administrează oral, în furaj sau în apa de baut, astfel:

Suine: 50-150 g produs/100 l apă (10-30 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală), sau 0,5 – 3kg produs/tona de furaj, o dată pe zi, timp de 5 zile.

Viței, miei, iezi, mânji: 1-1,5 g produs / 10 kg greutate corporală (20 - 30 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală) . Se administrează zilnic în furaj sau în apa de băut, timp de 5 zile consecutiv.

Câini, pisici, iepuri, nurci: 2,5 g produs/ 10 kg greutate corporală (50 mg oxitetraciclină clorhidrat/kg greutate corporală), împărțită în 2 doze, timp de 5 zile consecutiv.

Păsări (pui broileri, găini, curci, rațe, găște): 50 -150g produs /100 l apă (10-30 mg oxitetraciclină clorhidrat / kg greutate corporală) sau 1 - 2 kg pulbere pentru o tonă de furaj (20 - 40 mg oxitetraciclină clorhidrat / kg greutate corporală) , o dată pe zi, timp de 5 zile consecutiv.

Pești: 20- 30 g produs / 100 kg pește, zilnic. Pentru peștii adulți produsul se administrează într-o singură repriză iar pentru puiet produsul se administrează în 2 reprize. Produsul se poate administra în hrană sau local în bazin. Pentru tratamentul puietului se amestecă 100 g produs bine omogenizat sub formă de pastă cu 50 kg furaj granulat (pelete).Adulții și puietul se pot trata timp de 4-8 zile sau pînă la remiterea semnelor clinice.

1
Comisia Comercială
PASTEUR.
Căpitan